

Vicia

\* pedunculis elongatis

apice undulatis

1. pisiformis V. petiolis polyphyllis: folioli ovatis in finis sesquibus ovato-sagittatis <sup>apice undulatis</sup> basi <sup>undulatis</sup> subdentatis
2. dumetorum V. folioli reflexis ovalibus mucronatis, stipulis subdentatis lanceolatis semihastatis
3. sylvatica V. folioli ovalibus, stipulis basi dilatatis petiolo denticulatis
4. casubria V. p. pedunculis sub sex floris, folioli lanceolato-oblongis mucronatis, stipulis subulato-hastatis integerrimis
5. cratica V. floribus imbricatis, folioli lanceolatis pubescentibus, stipulis lanceolato-hastatis integerrimis
6. onobrychieoides V. floribus distichatis, folioli lineari-bus, stipulis lanceolatis basi subdentatis
7. brenna V. petiolis sulcatis subodoriaphyllis, folioli lanceolatis, stipulis lanceolatis sagittatis basi subdentatis
8. micifoliana V. folioli oblongis, stipulis lanceolatis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis
9. benghalensis V. folioli integerrimis, stipulis integris leguminibus erectis scissis
10. monantha V. pedunculis sub trifloris aristatis, folioli lineari-bus, stipulis bifidis

\* \* floribus subsplisibus vel brevipedunculatis

11. sativa V. ~~foliis~~ leguminibus subternatis erectis, foliolis retusis, stipulis notatis  
12. globosa V. leguminibus solitariis, foliolis ovatis, stipulis notatis quadridentatis  
13. cathartica V. leguminibus subsolitariis erectis glabris, foliolis inferioribus obcordatis  
superioribus trijunctis lanceatis, stipulis semisagittatis  
14  
15. lutea V. leguminibus reflexis pelopis solitariis pentaspermis, corolla vexillis glabris,  
stipulis notatis  
16. hybrida V. leguminibus subsolitariis reflexis pelopis pentaspermis, corolla vexillis villosis  
17. peregrina V. leguminibus pendulis glabris tetraspermis foliorum superioribus lanceatis  
inferioribus  
18. sepium V. leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis lanceolatis-ovatis  
19. bithynica V. leguminibus pedunculatis solitariis, foliolis quaternis ovatis-lanceolatis,  
stipulis dentatis  
20. narbonensis leguminibus subternatis erectis sativae formae, foliolis subsplisibus subovatis  
oblongis  
21. sola V. caule erecto, leguminum futura lavi, petalis absque dentibus  
22. serratifolia V. caule erecto, petalis absque dentibus, foliolis serratis

Vicia flore magno a Ramond est

Sativa pyrenaica minima foliis cordatis herb. Tournes

subterranea

Vicia similis supra infraque terram fructus edens C. Bauhin.

magellanica

filifera mis samojis foliola 1-2-3. puzo

Vicia

peregrina Vicia leguminibus subsessilibus solitariis pendulis, foliis linearibus  
tridentatis.

Vicia peregrina. leguminibus subsessilibus pendulis glabris tetra spermis,  
foliis linearibus emarginatis Lin. S. V. pag. 664.

Frequens in Gallia australi et Barbaria cultis

Caules prostrati, diffusi; tetragoni, pedales, glabri

Folia petiolata, pennata 4-5 puga: foliola sessilia, alterna, saepe  
pollicaria, <sup>glabra</sup> linearia, apice ~~acutis~~ <sup>obtusis</sup> dilatata, tridentata: denti  
bus plerumque aequalibus, interdum interdum parum longior et  
angustiora. Foliola soleonem inferiorem cunei forma, vix bili  
nearia, relicta cum denticulo minuto.

Petiolus palmaris. Cerkus simplicis semis vel trifidus.

Stipulo semisagittata, lineam longa, integerrima.

Pedunculus axillaris, solitarius, pubescens, bilinearis

Calyx pilis albidis adpressis

Legumina juncea pilosa, staba glabra

*Sativa leucosperma* Vici  
 foliis caule foliis <sup>leguminibus</sup> que villis raris adpersa 5-6 sperm *hexosperm*  
~~W~~ *stipitata* foliis parvis longioribus glabris leguminibus lon-  
 gioribus latioribus Tomulosis  
*minia* simili glabres folia ut in V. legumina angustiora  
 semina ~~magis~~ Tomulosis 3-4 sperm  
 E. *helvetica* multo minor raris villis

~~*reticulata* <sup>70</sup>  
 Pteris foliis cordato-subtrilobis multivenosis, pediculis demum  
 formis *leptocarpis* major, arborescens, foliis plerumque Plum.  
 gen. 51. Amer. 57 t. 25. f. c.  
 Pteris *reticulata*, foliis cordatis quinque nervis reticulatis  
 Am. Syst. veg. 75  
*Habrodon Martiana* 5  
 Endox *argyrea* DC. foliis magnis, acuminatis, induratis  
 tridactylis nervis, proder nervis duo aliores, suboppositi.~~

umbellatum

Piper foliis cordatis subrotundis <sup>acutis</sup> <sup>gracilibus</sup> multinerviis, nervi petiolique villosis, spicis umbellatis

Saururus arborascens; foliis amplis cordatis non umbellatis Plum  
Bonae Spei 51. Amer. 56. t. 73.

Piper umbellatum foliis cordatis subrotundis acutis venosis,  
spicis umbellatis L. Syst. veg. 75. Swartz obs. 21.

Habitat in Domingo 24

tri vel quadrij  
bale, simplex

Paulis incanum. <sup>4</sup>folia amplissima, <sup>versus apicem caulis,</sup> acuta, venosa, tridecim nervi, praeter nervi duo altiores, suboppositi. Petiolus basi vix nervi. Spica axillaris, <sup>um</sup> tres vel quatuor in singulis umbella.

nummularia (sup. foliis oppositis orbiculatis subpeltatis - alteris vel  
caulis filiformi nudato reperto de Mart. Coll. & pag. 82.  
Habitat in Florida maritima)

12-13 grandiflora Vicia <sup>Vicia</sup> pedunculis subuni floris, folioli ovalibus, vexillis gla

bris  
Vicia floribus pallide luteis amplissimis Neapolitana Raj Hyl.  
Storp. ext. ont. pag. 261.

Legi floentem ad Paup. Lippum Neapoli mense in sepibus mense  
Aprili

Caules prostrati, striati.

Colia infima biplega, <sup>exteriora longa</sup> <sup>inferiora breviora</sup> <sup>opposita</sup> <sup>ovata</sup> <sup>late</sup> <sup>pollicia</sup>  
interiora alterna, plena <sup>marginata</sup> <sup>multonata</sup>, <sup>oculo</sup> <sup>ornato</sup> <sup>valle</sup>  
ria, apice ut emarginata, <sup>subulosa</sup>, nervosa, in foliis infimis rotundiora vel obcordata  
subulosa, nervosa, in foliis infimis rotundiora vel obcordata

Carina pinnatus. Stipula inferiori dentata calice subrotata:  
Pedunculi axillares, solitarii, brevissimi, unif. biflori.

Calyx ~~prostratus~~ <sup>nervosus</sup>, pilis raris adpressis  
Corolla <sup>ochroleuca</sup> ~~latea~~. Vexillum ovatum pollicare interdem medio  
veni <sup>fusis</sup> <sup>pectum</sup>. Carina apex violaceus  
germen glabrum, lineare.

(variat floribus sessilibus solitariis vel binis, floribus pedunculatis et pedunculis  
 3-4 floris. affinis lutea corolla vero multo major foliola diversa, germen  
 lineare, glabrum

5 - *Sium* El. *Orthocymus*, foliis oppositis ovatis duplicato serratis, radice  
*Orthocymus oppositus* Kun. *Suppl.* pag 266. f. v. pag. 494  
*Sium serratum* Hoffm. n. g. n. 40.  
*Orthocymus* in *Nov. Zeland.* 5  
*Sium* *Orthocymus* *compressifolium*. *Ecce* *pro* *colore* *glabro*  
*filiis* *versis* *in* *pro* *colore* *glabro* *compressifolium* *radice* *tripolycera*, *caete*  
*compressifolium*



*Loricata* V. Legumini bus sessilibus solitariis reflexis glabris, caulebus erectiusculis  
foliis glaberrimis Smith. fl. Angl. 2. pag. 773. Engl. bot. 7483.  
*Vicia hybrida* Hudf.

Habitat in petrosis montanis &

Habitus V. lutea, sed caules breviores et fere erecti, ramosi. Tota glaberrima. Siliola elliptico-lanceolata, mucronata, vix unquam retusa. Appu-  
lo viridi vel subfuso. Flores cinereo flavescetes, interdum dilute  
purpurei. Legumen sphericum, fuscum leve

Vicia

Vicia speciosa Creta herb. Tournef.

Habitat in Creta herb. Tournef.

Caules tenues, glabri, angulati. Folia 4-juga: foliola petiolata, altera na, unguicula na, oblonga, mucronata, vellesula, obscure simpliciter venosa, exteriora minoria. Cincinnus trifidus. Stipula semihastata, acuta, intacta. Pedunculis axillaribus, folio longioribus, 4-5 flori. Calyx villosulus, dentibus, pubulatis. Corolla rix semipollinari, glabris. Germen glabrum.

*Vicia*

*Vicia orientalis*, multiflora, argentea, flore variegata Tournef. Cor. pag 27.

Habitat in Oriente

herbes

*biflora* Vicia pedunculata subtrifloris folio brevioribus

Habitat in Barbana Desfontaine

Caules angulati glabri, tenues. Foliola linearia, villosula, uti petioli, acuta  
semipollicaria. Stipula subulata, hastata. Flores magnitudine Viciisylva  
Vicia. Calycis villosi.

altissima Vicia

Habitat in Barbara Desfontaine.

Affinis Vicia brevis. Caulis angulatus, glaber, foliola glabra, unguiculata, nervosa, basi acuta, apice submarginata cum mucrone. Circhi subpinnati. Stipulae semisagittatae, dentatae inciso: laciniae setaceae. Pedunculi foliorum longissimi, Flores circales II. geminati. Pedicelli geminati

procox Vicia

Vicia incana major et procox parvis; flore suavemente Tournef

Habitat circa Lutetiam sicut Jusf.

Caules angulati, glabri, superne villosi. Siliola unguiculata, alterna, exteriora majora, lanceolata, obtusa, mucronata, interdum in inferioribus extrema subretusum mucronata, subtridentata. Flores 2-3, sessiles. Stylus parvis ovato, semisagittato, acuto, macula nigra. Calyx et vexillum villosi. Legumina unguiculata, oblonga, villosa, acuminata, disperma, reflexa haud bene convenit cum Jatro

procox Lucia

Vicia procox luciana major et procox parisiensis, flore suave rubente Tournef  
-Infl. R. herb.

Habitat circa Lutetiam herb. Tuss.

Caules angulati, glabri, <sup>linguiculis</sup> superne villosi. Bobicula lanceolata, villosa, alternis, mucronata, obtusa, interdum <sup>in senonibus</sup> exteriora majora, subret interdum in inferioribus subretusa cum

Vicia

an peregrina

Habitat in oriente herb. De lesper

Caulis subtetragonus. Foliola pedicelata, lineari-cuneata, alterna, inferiorum  
cuneata, superiora lineana, omnia oculo armata <sup>rare villosa</sup> <sup>foliis brevioribus</sup>  
apice rotundis <sup>indentatis</sup>. Stipulae semipeltatae. Pedunculi <sup>axillares</sup> uniflori  
Flores nutantes, magnitudine V. dumetorum, flavae. Calyces et legumina  
glabra.



*Canescens* Vicia

*Vicia canescens* Millard: DC.

Habitat in Syria. Herb. Desfont.

Tota villosa sericea. Caulis, pedalis, trigonus, striatus, subramosus. Folia pinnata cum impari 13 pinnis, interdum circiter brevis, simplicia, pollicari tercio folioli terminata: foliola alterna lanceolata, pollicaria, sessilia. Stipula ovata semipollicares, hastata. Pedunculi axillares, folio fere longiores, circiter 9 flori. Flores ferundi. Legumen pollicare lineari-oblongum, compressum.

nungero *Vicia pedunculata* multiflora, floribus remotis, foliis lineariibus

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caulis rigidus, tetragonus, sulcatus, glaber, ramosus. Sola spica, remota: folia linearia, patentissima, bipelliana, alterna, remota, mucrone pungente terminata, rigidiuscula, que latis villis rarisimis flavescens adpressis, vinctis, extrorsum mucrona. Perisperm trifidum. Petiolus Inguet. Stipula lanceolata, semisagittata, auriculo lunato. Pedunculi elongati, striati, superne villosuli. Flores penduli, solitarii, vel geminati, magnitudine *Viciae* benghalensis. Calycis glabrispili. Germen glabrum.

calicinata Vicia

Habitat in Barbana Dit Desfontaine

polyphylla Vicia

Vicia orientalis multiflora iniana, angustifolium folio Tournef. Cor.  
Habitat in Oriente et Maus Barbara dicit Desfontaine

Vicia

Vicia cretica, multiflora, latifolia, flore inter se purpureo Tournef. Cor

pag. 27.

Habitat in Creta herb. Tournef.

Caulis glaber striatus, angulatus. Folia tripartita: foliola alterna, lanceolata  
petiolata, exteriora <sup>2</sup>minora, unguiculata et ultra, obsolete nervosa, vix  
vellosa, mucronata. Cochlearis trifidus. Stipulae inferiores lanceolatae semi  
hastatae, superiores lanceolatae. Pedunculi axillares, foliis longiores: fl  
res mucronati, distantes, divisi in 14. Pedicelli penduli. Calyx villosus  
lacini subulata

*setifolia* Vicia pedunculis unifloris, leguminibus turgidis oblongis

Habitat Herb. Desfontaine

Caules filiformes, angulati, glabri. Solistia inferiora lineari-oblonga, superiorum linearia, angustissima, mucronata, anguiciliana, ope lentis, uti petiolis adpressis villis aliquot. Stipula subulata, hastata. Flores parvi. Calyx cinerascens; Legumina semipolluciana, reflexa, villosula.

villosis sumo Vicia hirsuta, pedunculis trifloris, stipulis hastatis, auriculis bifidis.

Habitat in Canariis Herb. Des. gontuon

Caulis prostratus, pedales et ultra, angulatus, tenues, herbacei, villosissimi, uti tota planta. Foliola linearia, obtusa, unguiculata, alterna. Pinnis pennatis. Pedunculi bi-<sup>f.</sup> triflori. Flores apice purpurei. Semina agglutata purpurea, lasea.

minor *Vicia*

*Vicia minima* cum siliquis glabris Tournef. 4. Pl. 44. 397.  
*Vicia* sive *cracca minima* species cum siliquis glabris Bauh. hist. 2. 315  
Habitat. ex herb. Mus.

Caules plures pedales adscendentes angulati

Reprint. secundum specimen - conf.



argentea Vicia

Vicia orientalis multiflora argentea flore variegato Pournesf. Cor.  
Habitat in Oriente Herb. mus.

Tota villosa. Stipula hastata, lanicolata

Descript. uberius secundum specimen conferendum

obcordata Vicia pedunculis trifloris, foliis obcordatis, stipulis incis.  
Lent. orientalis, foliis minimis, flores ex albo et coeruleo variegato Vahl  
herb.

Vicia pyrenaea minima repens et lignosa, ciceris folio Bagon. herb. Vahl  
Cantii

Habitat in oriente. herb. Mus.

Planta palmaris. Caulis plures, tetragonis, diffusi, ramosi, uti tota  
planta glabri. Crotia 2-3 fidi vel pennati. Legumina non vidi.

Descriptio ulterius a specimenis petenda

incana Vicia pedunculata multiflora, floribus umbellatis, folioli lanceolatis canescentibus, stipulis inferioribus hastatis

Vicia orientalis multiflora incana angustissimo folio Tournef. Cor.

Habitat in Oriente Herb. Mus:

Differt Vic: cracca, an modo varietat. Tota villosa-virescens subsericea. Caulis pubescenter, angulatus. Efoliola subpollicaria, mucronata, subpetiolata alterna. Stipulae superiores lanceolatae, latae indivisae, Peduncululi axillares, longitudine folii. Flores cernosi, pauciores rariorem quam in Vicia cracca, minores et magis distantes

antartica Vicia ~~pedunculis~~<sup>sub</sup> uniflori foliis longioribus, foliis conjugatis pinnatis  
etque linearibus, stipulis subulatis

Habitat ad fretum mayellanicum Com meson herb. Mus.

Caulis filiformis glaber, striatus. Folia inferiora conjugata,  
superiora quaternis pinnata: foliola in quicquid, acuta,

Pedunculi 1-2 flori mucronata<sup>4</sup>. Flores parvi, stipites calycis uti pedunculis cina  
rascentes. # Cincinnus brevis bifidus.

capillari Vicei leguminibus subsessilibus solitariis glabri, folioli linearibus,  
stipulis lanceolatis semisagittatis, auriculis integri

Habitat ad fretum Magellanicum Commerson Herb. Mus.

Caulis filiformis, glabri. ~~Folia pinnata vel pinnato bipinnata~~  
~~quinata~~ Folia ~~interdum ternata~~, superiora quaternis vel qui-  
natis pinnatis; foliola alterna, linearia, semipollicinaria, utrin-  
que acuta. Stipula parva #. Vexillum coarctatum, alba et ciliaribus  
albo Commerson # Cirrhus nullus nisi feta, an Orbis species?

Betifolia Vicia pedunculis ~~subbifloris~~ foliis subaequantibus, foliolis linearibus, sequis  
ovatis ovatis im maculatis ~~sterenimis~~

Habitat in monte videtur Comnesor herb. Guss.  
tenuis ~~sterenimis~~

Caulis filiformis, glabris, folia Vicija: foliola <sup>opposita vel</sup> <sup>angustissima</sup> ~~albescens~~ pollicaria  
~~subrotundata, pubescentibus, cula in mucronem~~  
vel bipollis, <sup>inferiorum</sup> <sup>panem</sup> <sup>menora</sup> <sup>et</sup> <sup>caetera</sup> ~~Ricinus simplex~~. <sup>parva</sup> <sup>menora</sup>  
acuta Pedunculi capillares, biflori, <sup>in</sup> <sup>ter</sup> <sup>flori</sup>. Legumina oblonga, glabra, <sup>5</sup> <sup>pa</sup>  
mar 4 Calyx glabri  
le

tenera *Vicia pedunculata* brevis, imis uniflora, folioli linearibus, obtusis inferioribus  
obtusis, stipulis basi bidentatis

Habitat in monte video Commerson herb. Tuss.

Palmarum, tenera. Caulis angulatus, superne ope lenticis villosus. Folia in  
seniore trijuga, superiora quadrjuga: foliola mucronata; inferiora linea  
ri cuneata, superiora angustissima, glabra, pollicaria. Circulus simplicis  
Stipulae acuminatae, parvae, Legumen lineare, oblongum, septem pollicaria  
re, rudens villosus, heptapermum.

Le-abra vicia Leguminibus solitariis subsessilibus reflexis punctato-glabris pilosis

Habitat. Herb. Gusf

Heris

Legumina

Caulis angulatus, pilis prostratis superne uti foliola utraque adpressis. Folia  
ortopugi: foliola linearia acuta, semipollicana. Cirsium viridius. Hi  
pula parva, macula pallida annulo nigro cincta notata. Calyces  
glabri. Legumina pollicana lata.



setifolia Vicia pedunculis subtrifloris, foliis subaequantibus, foliolis linearibus,  
stipulis ovatis imbricatis induratis.

Habitat in monte video Compressor herb. Turc. et Mysor. <sup>interdum quadriflora</sup>  
Caules liliiformes, striati, glabri. Folia triflora: foliola opposita vel alter  
na, <sup>interdum</sup> pollicaria et ultra, <sup>angustissima</sup> inferiora breviora et latiora, subpedunculata, ob  
tusiuscula cum mucrone. Cirrhos simplex. Stipula parva, acuta.  
Pedunculi capillares, sesqui pollicares, interdum biflori, raro quadri  
flori, plerumque triflori. Calycis glabri. Legumina oblonga, glabra  
compressa, semiunguem lata, pentasperma vel 6 sperma.

brachycarpa Vicia Leguminibus Vernis subsessilibus oblongis hirsutis, folioli linearia  
oblonga cuneataque.

Vicia sylvestris incana major et prociot Parisiensis flora grave rubente  
Tournef. Inst. R. 4.

Habitat. Panf. Herb. Guss.

Caules sulcati, angulati, superne ovulo armata villosi. Foliola alterna  
obtusae cum mucrone, utrinque villis raris adspersa. Stipulae minutae ova-  
tae, integerrimae, Peduncululi vix ulli. Flores 2-3. Calyx pilosus. Legumina  
oblonga, acuminata, unguiculata 1-2 sperma. Semina villosa-fuscescentia  
an sativa

Sylvatica *Vicia pedunculata* multiflora foliis ovalibus, stipulis dentatis  
lati Lin. l. V. p. 664. Oed fl. Dan. 277

β. *Vicia caspica* flor. Suevica oed. fl. Dan. tab. 98.  
*Vicia militans* Crantz.  
*Vicia multiflora caspica* etc.  
Plukh.

ratua *Vicia*, pedunculis quadrifloris brevibus, foliolis cuneatis ratuis, leguminibus glabris  
*Vicia*, floribus albis, vexillo lutescente, semine nigro perennis herb. *Tusf.*  
Habitat Smyrna 2

Caulis fuscus angulatus, glaber, folia bipinnata: foliola bipinnaria  
glabra, stipula minuta subulata, denticulata. Pedunculi pollicares.  
Legumina oblonga <sup>2</sup>lanceolata  
prope demetorum collectus

retusa Vicia pedunculis <sup>qu</sup> multifloris qu

ovobordeo Vicia

Vicia ovobordeo pedunculis multifloris, petiolo brevioribus: foliis  
ovato-lanceolatis, supra villosis, duorum parum absque impari;  
spulis ovato-acutis Wulf. in coll. Faegu 4. p. 323.

Habitat in montibus sylvestribus Canadensis.

Facies V. sepium. Caulis cubitali tetragonus, ramosis, lani. folia  
brygia. Foliola sespilia lanceolata ovata <sup>sespilia</sup> villosa. Spula ovata  
breviter basi notata. racemi 7-8 flori. Corolla flava. Legumen nu-  
dum pediculis 10 spermatum

michi ignota



caroliniana V. petiolis polyphyllis: foliolo lanceolatis mucronatis,  
stipulis ovato-lanceolatis Walt. fl. Car. p. 102  
Habitat in Carolina.

non vid.



bohemica V. foliis ellipticis stipulis integris, floribus racemosis  
Mayer boeh. abh. 3. p. 1707. p. 316. t. 11. a. b

michi ignota.

2. *Dumetorum* V. foliis reflexis <sup>ovalibus</sup> ovatis mucronatis, stipulis subdentatis lca.

Spec: pl. pag. 1035:4

*Vicia maxima* Dumetorum Bauh. jun. 345:

*Vicia sylvatica maxima* p. fo. similis Bauh. hist. 2. p. 315:

Habitat Thuringia, Gallia &

Caulis Inquies glaber uti tota planta. Folia cum pinnis pennatis

triplicibus, na alterna distantia subtus pallide viridia nervis

venosa. Stipula parva lanceolata hastata dentibus plerumque

3-4 setaceis. Curvis pennatis. Pedunculi foliis longioris tri vel 4 flori

ferre remoti. Legumen lanceolatum glabrum utraque acutum

culta

3 Sylvatica V. foliis ovalibus, <sup>base dilatata, petalis</sup> stipulis denticulatis L. V

fl. Dan

Tab. 277.

Vicia multiflora maxima perennis, saporis odore, floribus albertibus  
lineis conulis notatis Pluken. alm. 307. t. 71. fig. 1.

Habitat in Suecia, Germania, Gallia sylvis &

montanea

Caulis sulcatus angulatus glaber. foliola unites & puga glabra emar  
ginata mucronata femiunguiculata alterna remota. Circus pendula  
stipula basi dilatata <sup>hispida</sup> petalis denticulatis petalis. Petioli et pedun  
culi striati. Pedunculi folio longior striati. 13 flori flores di  
stincter penduli calyx glaber.

gerardi <sup>petiolo polyphyllis</sup> <sup>cauleque erecto</sup>  
~~pedunculis elongatis~~ foliis lanceolatis villosis stipulis integris  
pedun

Vicia perennis incana multiflora Magnol. Monsp. 277

Vicia pedunculis multifloris petiolo polyphyllis foliis  
villosis, stipulis acutis integris appendiculatis  
Gerard. fl. gallopr. p. 497. fig. 19

Habitat in Gallia et Italia &

a Gerard. haecque diversa quo caspibica, quod villosior  
robustior floribus foliisque cornosis viciem  
elongatis Leguminibus lanceolatis pentaspermis

9 Casubica V. pedunculis subser. floris, folioli denis ovatis acutis, stipulis integris  
Linn. S. V.

fl. Dan. tab. 90.  
Vicia gerardi Taigui. fl. austr. 3. 4. 229 S. V. pag

Vicia multiflora Casubica frutescens, siliqua lentis Pluken.  
alm. 307. t. 7. fig. 2.

Habitat in Germania

(causa et spont) Caulis triquet. a nodo ad nodum flexuosus. leviter pubescens  
foliola 2. vel 3. p. (in siancia) oblonga vel lanceolata oblonga  
obtus. mucronata subtus sub p. ruse pubesca, nervosa. costis simplis  
trifidis, vel pennatis stipulo subulato hastato integerrimo. Pedun-  
culi folio breviores & flori cincti. Calyx parum profus. Legumen  
ovale six pollicare, glabrum in siancia

vicia

multiflora

Leys. fl. halerps

pag 725

Siancia habitus parum recedit a culta Taiguii folioli copiosioribus  
subovato lanceolatis

~~aliam n. fit da Belladi caule frutescens robustiore floribus  
copiosioribus leguminibus longioribus lanceolatis pentaspermis  
non differentia vera commota includi potest sive ac humerus  
florum et alia differentia formatur~~

Jude

*Vicia pulchrum* generis multiflorum sive galega species quibusdam Bauh  
pin.

Caulis tetragonus, angulis acutis, striatus, purpureo ceno velopis pilis. Folia  
sessilia, spithamea: foliola frequentia, oblonga, obtusa, semipollicaria, albo  
hu, exstropium minus, striata, facie sive galega officinali. Stipula subulata  
Penthi bifidi. Pedunculati axillares, foliis brevioris. Flores distantes. Legumi  
na glabra, unguiculata 1-2 per ma. Semina glabra herb. Mus.

canescens

V. folus superantibus subterhohis: foliolis ovatis  
oblongis lanuginosis, stipulis semipagittatis integris  
Billard. in pl. pyr rar. dec. 1. p. 17. t. 7.

Habitat in pyna

ignora

domestico & pedunculato

altus 4 O foliis longis



6 onobrychoides V. floribus distinctibus; foliis lineantibus; stipulis inferne dentatim  
latis Len. Spec. pl. pag. 10364. All. fl. pedic. 1198. tab. 42. fig. 1.  
Vicia onobrychidis flore Bauh. prodr. 149. p. 345

Habitat in Gallia

(Spontanea)

caulis angulatus glaber. folia 6-8-juga. foliola glabra, obtusa, mucronata. stipula lanceolata versus basin altero latere dentibus geminis remotis. rachis pennatis. pedunculi filicati foliis duplo longiores. Flores pedicellatis remotis, demum nutantes. Calyx glaber. Legumen utrinque acutum glabrum. Stipula ~~infusa~~ <sup>radice duplo major</sup> tridentata secundum f. all.  
Vicia perennis multiflora, flore coeruleo est albo multo Bot  
Monsp. herb. thum

5 cracca v. floribus imbricatis, folioli lanceolati, pubescentibus stipulis integri.

Lin. I. V

fl. Dan. Tab. 804

Vicia multiflora Bauh. pin. 343.

Vicia Sylvestris fricata Bauh. pin. 345.

Habita in campo pratis agris. &

(pment)

Caulis angulatus striatus leviter pubescens. <sup>involuta</sup> Coleola 11 juga brevissima petio-  
cata alterna oblonga angusta obtusa mucronata venella sericea  
adulterea leviter pilosa interna majora pollicaria. Cirrus trifidus.  
Stipula lanceolata hastata. Pedunculi elongati flores copiosi con-  
gesti corulei. Calyx pilosus pilulus. Legumen

legentes varietates in herb. Vaill. vidi

a. Vicia fructus flore purpureo violaceo alio albiaribus.

Caulis glaber foliola villosa stipula lineares absque auriculo  
flore pauciores

b. flore pallide coeruleo

v. flore toto purpureo violaceo herb. Vaill.

d. flore purpureo multiflora

*tenuefolia* V. foliis linearibus acutis trinerviis, Stipulis  
linearibus integris hastatis, floribus embriatis caule  
erectiore.

Vicia *tenuefolia* foliis linearibus trinerviis acuminatis,  
Stipulis linearibus integris, floribus embriatis, caule erecto Roth fl. germ. 1. pag 309  
Habitat in Germania Dania

maxime affinis *Crocea* at foliola angustissima acuta  
floris minoribus

Vicia *perennis* multiflora spicata coerulea Separia  
monf. bot. 2. pag. 6 Feb. 14 hinc pedunculata videtur herb.

mus.  
Stipula villosa

7 bennis V petiolis sulcatis subdecaphyllis: foliis lanceolatis glabris  
An. S. V. Gmel. pl. 4. p. 10. Tab. fig. 2.

~~Vicia perennis mal~~

Vicia pedunculis multiflora, petiolis polyphyllis: foliis lanceo-  
latis glabris Hort. Ups. 2194

Habitat in Libania II

Caulis aetudine hominis interdum triplo altior. Coleola 11-13, nervosa  
saepe acuta, mucronata distincta. Stipula lanceolata prope  
producta raris dente uno alterove. Pedunculi foliis longioribus: flores  
nudaes basi alba vel alba conuleum venis violaceis punctum  
legumina compressa glabra utraque acuta

culta

an in differentia, etiam legumina glabra addendum est. tota differentia  
non placet

Syn. Magnolia dubium forte potius ad Onobrychoideum

*Canaliculata*  
8 *vespicularia* V. foliolis oblongis stipulis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis Lin. *St. Spec. pl. pag 1036.* +  
Sicilia orientalis, flore juvene rubente, siliquis brevissimis Boeckl. *hugb.*

2. p. 44.  
Habitat in Oriente.

Caulis striatus (sulcatus Lin.). <sup>foliolis</sup> folia 6 vel 7 jugis, obtusi, mucronatis subvillosi. ~~Stipulae planatae. Stipula canaliculata angustissima, bifida.~~  
Flores 2 in pedunculo longitudine ~~ipse foliorum~~, mucroni atropurpurei. Calyx villosus ~~laciniis spatulatis.~~ Legumina mutua compressa, ovato-oblonga, villosa pecta sperma.

9 benghalensis V. foliolis intersepticis, stipulis integris, leguminibus erectis pilis  
Lin. S. V.  
Vicia benghalensis hirsuta incana, siliquis pappi Heron Lugdb. 623. D. 625

Habitat in Stoeckadibus 0 foliosa  
Caulis ~~hirsutus~~ hirsutus. Siliqua 6-7 puz, subvellosa obtusa mucronata, pollicaria.  
Cinthus pennatus. Stipula hastata angusta fimo, flores 3-6 in pedunculato

in herb. Fus. alia  
similis foliolis longitudine fere foliorum. Calyx vellosus; lacinis peltatis. Corolla in  
subgenere 6  
pedunculato 4  
flosi stipulis  
hastatis an herb  
resolucione 2

tenues pinnatis, canno apice nigro.  
Stipula linearis subfoliata. Foliole oblonga vel lineari  
oblonga, obtusis v. emarginatis, subtus villosae, ut anguiculatae. Flores  
in racemo elongato uniter 7. Legumina pollicaria  
glabra, lanceolata, tenella seneca lat. Fus.

Vicia perenni incana multiflora Magn. bot. Paris  
Vicia argentea flore atro sanguinea ex insulis Stoeckadibus  
Vahl herb  
tota hirsuta. Caulis angulatus. foliole lanceolatae, semipollicariae  
na. Cinthi compositi. Stipula ovata, acuta, in se lacinia  
acuta. Flores uniter 10 in racemo nutante herb Mus

Definitiva melior inter hanc et suppleam quorunda

Duo specimina sub nomine benghal. a primis diversis alter legitur  
manibus globis alter villosis ~~de quo de~~ ambo forte a specimine herb  
Mus. Diversis ideoque dubios ad unde spectat descriptio

10 monantha Vie. pedunculis subbifloris aristatis, <sup>linear</sup> folioli lanceolatis stipulis  
bifidis.  
Siccia monantha pedunculis unifloris aristatis, folioli lanceolatis  
obtusis; stipulis bifidis Retz. obs. 3. p. 39. \*

novit

β. folioli linearibus angustissimis  
Habitat in Barbana oriente O

Caulis utriusque peregrina striatus quam in reliquis acute triangulatus  
striatus glaber. folia sesuga. folioli lanceolatis obtusis, in β an  
gustissimis, glabra nervos venos mucrone minutissimo terminata  
alterna destantia ciliis pennatis. Stipularum cae per appen  
diu posticus longitudine ipsius stipula falcatis angustis. Peduncu  
li pollicares 1. 2 flori rarius triflori. Flores nutantes glabri  
ca β subvillosi corollam vix illum pallidum venis violatis  
saturatioribus. Legumina lanceolata glabra 6. 7. perispermum



19 bithynica V Leguminibus pedunculatis foliatis, folioli quaternis ovali-  
lanceolatis, stipulis dentatis C. Spei. pl. Voy. 103 & Jacq. Hort. 2. V. 147  
alt. fl. pedum. 4. 1194. Tab. 26. fig. 2.

Proica floribus albis foliis circa radicem denticulatis Baer  
baun cent. 3. p. 28. t. 45. fig. 2.

Habitat in Italia Bavaria arvis &

Pauli stratus glaber. Siliola quatuor alterna vel opposita  
lanceolata mucronata interdum (si culta) sublonga saepe bipollicia  
nisi glabra. Petioli pennatis stipulis ovata <sup>temerisquidulata</sup> dentibus utraque  
dentata: dentibus cuspidatis, & pedunculus interdum folio longior  
biflorus plerumque brevior uniflorus. Calyx stratus pilosiusculus  
Legumen lanceolatum pilosum propositum margine sesquipollicem

18 *sepium* ✓ Leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliis <sup>concoloratis</sup> ovatis  
+ integerrimis. exterioribus decescentibus. L. V. fl. dan  
Tab. 699.

Vicia *sepium*, foliis rotundioribus acuto Bauh. pin. 345.

Habitat in Europa sepius ✓

Plant.

Caulis glaber utriusque, folia sepius. foliola pollicaria  
nervis venosa obtusissima mucronata alterna vel subopposita  
Stipula basi integerrima? - Cirrhus pennatus. Radiculus  
brevisimus. Legumina pollicaria.

+ integerrimis et legu. minus necessaria in differentia

11 Sativa ✓ Leguminibus subbinatis erectis, folioliis retusis, stipulis notatis Linn  
P. V. fl. Dan. Tab. 522.

Vicia sativa alba Bauh. pin. 344.

Vicia sativa vulgaris, semine nigro Bauh. pin. 344.

β. Vicia semine rotundo nigro Bauh. pin. 345

Habitat inter Europae segetes ☉

Caulis angulatus glaber. Foliola 6-7 juxta in foliis inferioribus  
obcordatis basi in superioribus parvis longioribus omnibus  
aliquot adpressis nervosi. Lobi trifidi. Stipulae <sup>profunde</sup> dentatae calicis  
flos solitarii vel gemini dentes calycis peli nonnullis legu-  
men

varietatem folioli linear lanceolatis nervosi peli in supremis  
foliis acutioribus in infimis obcordatis. Legumenibus tri-  
collisare Legi Turcici

Vicia Clumemenu Gmel. A. 3. p. 307. T. 33. fig. 1

Culta

12 globosa V. leguminibus subsessilibus solitariis, foliolo ovatis, stipulis  
notatis quadridentatis Retz. obs. pag. 39.

Habitat inter saxetes Dania O

(Mont)

Vicia angustifolia leguminibus subbinatis patenti-  
bus et foliis ovatis retusis emarginatis  
superioribus linearibus apice integerrimis stipulis  
dentatis seminebus globosis Roth fl. ger. 1. p. 310  
affinis Lathyrus folia infera 1 puga deinceps  
superne 4-5 puga foliolo alterna subtus villosa  
obtusis mucronata.

Vicia Lathyrus purpureo coeruleis floribus Lutheland

Herm. pers. 242. cum fig.

huius quoque pertinere videtur

Ravica potius genus God pers. 542

Vicia semine rotundo nigro Bant. prod. 342

17 Lathyroides ✓ leguminibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: inferiobus  
obcordatis L. N. fl. Dan. tab. 50.

Vicia lathyroides, purpureo-ceruleis floribus Herm. par. 242.

tab. 242.

Habitat in Europa arida O

(Spont)

Planta via palmans caulis <sup>triquetri</sup> plures diffusi simplicis. Folium radigalia  
conjugata <sup>obcordata</sup> <sup>proxima</sup> bijuga: superiora trijuga foliolis linearibus emargi-  
natis mucronatis basi parum angustiora, omnia leviter pilosa. Stipulae  
tantum in petiolis superioribus. <sup>implet</sup> Stipula parva serrulata  
legumina brevis pedunculata lanceolata glabra. Flores parvi  
purpureo-violetici

allioni tab. 59. fig. 2. via videtur eadem cum nostra

antipula dentata

17 peregrina ✓ Leguminibus subsplebis pendulis glabris Tetra per mis, foliolis  
superioribus <sup>Indes</sup> emarginatis Lin. S. V. Indentati

Vicia peregrina angustifolia foliis, siliqua lata glabra Plukin alia  
386. 4. 233. fig. 6

Habitat in Gallia ☉

Caulis Inquetus basi ramosus. Rami simplicissimi Inqueti, angulis  
foliis opposita semina angulata  
acuti. Folia inferiora bijuga, oblongata arenaria vasa sora cyam in  
caeteris. superiora 3-6 pajo juga ~~opposita~~ opposita vel alter  
na, pollicaria extrosum parva latiora arenaria. Cirsii pennatus. Stipula  
minuta hastata. Pedunculis brevissimus uniflorus, villosus uti calyx  
laciniis calycis subulato.

155 Lutea V. Leguminibus reflexis pelosi foliatis pentaspermis, corolla veillis  
glabris <sup>stipulis notatis</sup> Ten. Spec. pl. pag. 1037.

Vicia sylvestris lutea, filiqua hispida Bauh. pin 345.

Vicia flore luteo pallido, filiquis hispidis crassis brevibus propenden-  
tibus - Monf. h. 2. p. 62. p. 2. t. 21. fig. 5.

Habitat in Europa australi & Oriente <sup>Barbana</sup> O <sup>apertis pelosi</sup>

Spond

Caulis basi ramosus. Rami simplicissimi <sup>triquetri</sup> sulcati. <sup>Solia</sup>  
inferna 3-4-juga absque cirrho, minoribus rotundioribus: superioribus 9-10  
jugis, <sup>foliis</sup> breviter petiolata, alterna lineari obtusa mucronata, pubi-  
scentibus longis adpressis. Petiolus planus cirrho tripido. Stipula  
parva integerrima vel 2-identata macula fusca notata. Pedun-  
culus brevissimus calyx glaber. Legumina lanceolata compressa hispida

16 hybrida <sup>pedunculis subunifloris</sup> ✓ leguminibus reflexis pilosis pentameris; corolla vexillis villosis  
Len. Spei. pl. p. 10374 aequ. austr. t. 34. Vicia pannonica.

Habitat Mospetii Masplia, Babana O

culta

caulis <sup>anulata repens</sup> striatus raris pilosis. folia ov. o. puga. foliola alterna, petiolata  
lanceolata-oblonga, basi acuta, apice reflexa pilosa cum mucrone,  
pilosa. Pinnis trifidis: pedunculi axillares solitarii plerumque  
triflori. Calyx pilis longioribus mollibus pilosis: vexillum extus  
villosum legumen pilis albis hirsutum squula notata vel immatura  
lata

Vicia sylvestris flore albo flore Clus. pam. p. 744. 745.  
variat pedunculi uniflori et triflori brevibus

Vicia leguminibus punctatis pilosis scabra herb. Tus. p. 481 potius hybrida  
cum vexillum villosum vel etiam lutea



grandiflora V. foliis oblongo-ovatis <sup>ne 2 un. ciliis</sup> floribus ~~sub foliis~~ subumbellis  
ris sessilibus leguminibusque glabris stipulis denticatis  
Habitat Neapoli

30 narbonensi & Leguminibus subsessilibus subternis erectis, folioli senis subovatis,  
stipulis denticulatis. Lin. Spei. pl. pag 103 P<sub>4</sub>

Bona sylvestris Dod. pempt. 516.

Bona sylvestris, fructu rotundo atro Bauh. pin. 330.

Habitat in Gallia, Anglia &

(Sponst.)

Caulis sulcato angulatus simplicissimus pilosus prostratus superne. petioli  
pilosus. Folia <sup>conduplicata</sup> duo ternis, quaternis vel senis oblonga subopposita  
sita integerrima, pollicaria pilosissima in primis versus marginem  
altero latere parum angustiora. Cincinnus brevis simplicissimus  
stipula <sup>scabra</sup> fere ovata sagittata. Flores 1. 3. <sup>sub</sup> sessilibus. Corolla atropur-  
purea. Legumina bi pollicaria futuri scabra, pilosissima, inter  
singula semina lanata

an melius leguminibus  
oblongis.

----- futura scabra folioli ~~se~~ subternis

21 Faba V. caule erecto, petioli absque arthris <sup>superiora scorinum leguminum tenuis</sup> Lin. P. V

Bona f. Phaeolus Dod. pempt. 513.

Faba Bauh. pin. 330.

15. Faba minor f. equina Balch. pin. 330

(Culta) Habitat prope mare capricum in confinio <sup>Pespa</sup> <sup>convoluta</sup>  
Caulis glaber <sup>altissimus</sup> fuscatus angulatus. Siliola 40<sup>ae</sup> alterna, inferiora  
majora <sup>altissimus</sup> nervosa oblonga obovata vel oblonga alterna: Stipula  
semiovata denticulata. Petiolus planus. Pedunculus petiolo  
brevior, <sup>altissimus</sup> tripel quadriflorus. Ala in medio macula <sup>altissimus</sup> holoptera

Habitat prope mare capricum in confinio Pespa

*serratifolia* V caule erecto, petioli absque cirrho, folioli serrati Saigu  
se-aust. s. app. t. p. 7

Habitat in Hungaria, Tirol.

Cauli striatus glaber simplex folia infima cum  
bractea supra & supra foliola oblonga interve-  
nit quae pollicaria opposita venis sespita est  
dentato serrata. Stipula magna dentato ciliata  
vexillum purpureum alio sanguineo

H fa

12.9

13.

14.

15.

1.

1

1

1

*Sua carolinica* Walt. — *angustifolia* Roth.  
*bohemica* Meyer  
*canadensis* B. Mill.  
*tenuifolia* Roth.  
*multiflora* Less.  
*ex stipularis* Mill.  
*clymea* L.