

Vieüsseuxia

^{figura}
Vienspentia ~~usitata~~, foliis singulari, scapum vaginante longissimo
La Roche Diss. n. 3. t. 4.

Fris edulis; corollis imberibus, folio radicali scapum vaginante linea
ri canaliculato longissimo, stigmati labio interiore integro lin. 8 sup
pl. ^{van Has. cat. cum figura}
Morsa fugax, foliis gramineis tandem convolutis, stigmati petaloi

deo, petalis imberibus lin. 8 syst. veg. 95

Fris edulis; corollis imberibus, folio radicali scapum vaginante
lineari canaliculato longissimo, stigmati labio interiore integro
lin. 8 suppl. 90.

Fris edulis; imberibus folio lineari pendulo glabro, scapo multifloro
glabro. Thunb. Diss. n. 30

Habitat ad Cap. b. Spec. 4

Solum scapo 80pe triplo longius, erectum, apice dependens. Sta
mus profunde radicatus, raris pedalis, teres, flectuosus, superne di
vitur. Flores alterni, solitarii vel plures, subsecundi. Stigmati
labium exterius obtusum, integerrimum; interius bifidum. Lacinia
canaliculata, acuta, altero latere producta crenulata Thunb. l. c.
Variat corollis coeruleis, albis et luteis

H fugaces

122

Crinpa 7. foliis linearibus *Crinpa* Thurb. Fr. n. 36. tab. 1. S. V. p. 92.

Fr. *crinpa* corollis imberibus, foliis ensiformibus revolutis *crinpa*
petalis patentibus her. Luppel. pag. 94.

Habitat ad Cap. b. p. l.

Scapus palmari vel ultra, sulcatus superne ramisus divinus,
flexuosus. Folia radicalia, ad basem caulis, alterna, linearia
attenuata, reflexa, *crinpa*, sparsa squalia vel longiora. Flores
terminales. *crinpa* alterni inferiori pedunculati tres vel quatuor
natis lanceolata acuta finata unguiculari. Petala alterna
majora unguiculari, obtusa. alterna minora angustiora
stigmatis labrum ^{luteum} *crinpa* brevissimum luteum uterius bifidum
laciniis lanceolata acuta. varietas corollis tubis, corni-
ceis, incarnatis Thurb.

Fr. 12. et fr. parentis, *crinpa* et *crinpa* non nulli alii: *crinpa* *crinpa*
Stemina comata et vel proprii vel *crinpa* *crinpa* *crinpa* *crinpa*
et vel *crinpa* *crinpa* et *crinpa* *crinpa* *crinpa* *crinpa*

Vicissentia aristata; folio radicali unico caule duplo longiore La Roche Diss.

Gris ^{no 2.} *tricuspidata*; corollis barbata, folio radicali ensiformi, petalis alternis

Trifidis Lin suppl. 30. Gaerth coll. 4. p. 100. t. 9. f. 1.

Gris *tricuspis*; barbata folio lineari longiore scapo sub bifloro, petalis alternis *Trifidis* Thunb. diss. n. 15

~~*Vicissentia* aristata; folio radicali unico caule duplo longiore La Roche
diss. n. 2.~~

Habitat in Cap. b. sp. 7

Folium unicum, lineare, erectum, apice dependens, nervosum. Scapus
sim plex, teres sesquipedalis, erectus, teres, geniculatus, uni-biflorus.
Spatha lanceolata, angusta, valde attenuata, internodiis longioribus; apice
fusca. Corolla laciniis majoribus suborbiculato cum acumine,
pollicares; unguibus extus viridibus, intus flavis: minores multoties breviores,
laciniis trifidis, laciniis lanceolatis, divaricatis, lineam longis
Stigmatis labium interius bifidum: laciniis ovato, obtusa, erecta
Thunb.

Variet Corollis purpureis, albis, violaceis Thunb.

plumana 9 foliis linearibus sicapo multifloro, segmentibus petalis multifidis
Thunb. Fr. n. 16.

Morosa inopetala foliis gramineis, petalis tribus majoribus
Lin. Suppl. pag. 150 &

juncea a squamis bulbi basi distinctis
Morosa juncea Luy foliis subulatis Lin. Spei. pl. pag. 59.
Syst. V. ed. 13. p. 79. Mill. Diet

vegeta B. squamis bulbi basi connatis
Morosa vegeta foliis canaliculatis Lin. Spei. pag. 59.
Mill. Diet. 1. V. g. ed. 13. p. 79.
Habitat ad Cap. 6. Spei &

Scopus geniculatus flexuosus erecti usculus apice ramo
sui bracteatus, palmari vel pithamou. Folium lineare
reflexo patens sicapo brevius. Lamina obtusa violacea
unquiculares: alterna paulo angustior et brevior. Stigma
ta dilute coerulea cutellato bilabiata