

Vinea

1. minor V. caulis procumbentibus, foliis lanceolato-^{ellipticis} ~~ovatis~~, floribus pedunculatis, laciniis calycis tubo brevioribus.
2. major V. caulis erectis foliis ovatis, floribus pedunculatis, laciniis calycis longitudine tubi.
3. lutea V. caule volubili, foliis oblongis
4. rosea V. caule frutescente erecto, foliis ovali-lanceolatis obtusis.
5. parva V. caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis attenuatis
flora

1 minor V. caulis procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis
Lin. spec. pl. pag. 304

Plematis Daphnoides Dod. pempt. 405.

Plematis Daphnoides minor Bauh. pin. 301.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia &

Caules striati glabri. Folii brevissime petiolata, pollicisna
vel parvis ultra utrinque acuta, fere avenia, firma.

Pedunculi axillares uniflori solitarii. Lacinio calycis
lobulato

minor V

laciniis calycis tubo brevioribus

differt foliis minoribus, basi non rotundatis firmioribus

major V. caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis *Her. Spec. pl. p. 304*
Jacqu. coll. 2. p. 210.

Clematis Daphnoides major. Dod. pempt 406. Bauh. pin 302.

Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania.

*Tota glabra. Caulis teres. Folia petiolata ovata acuta, venosa
si pollicaria. Pedunculus axillaris foliarius ~~foliis~~ longior
uniflorus. Floresque pollicari laciniis calycis tubulato longi
tudine tubi.*

*major V. caulibus erectis foliis ovatis floribus pedunculatis, calycis
laciniis longitudine tubi*

5 pupilla V. caule herbaeo floribus geminis pedunculatis Lin. Suppl. 166. t. 5. v. p. 252

Vinea pupilla caule herbaeo erecto quadrangulari, foliis lanceolatis floribus geminis solitariisque pedunculatis Mur. in Com. gotth. 1772. p. 66. t. 2. fig. 1.

Vinea parviflora caule herbaeo erecto, foliis lanceolatis, floribus geminis involucriatis Retz. off. Jap. 2. n. 33.

Habitat in Tranquebaris hortis, vitium summum ☉

parviflora caule herbaeo erecto, foliis lanceolatis acutis Hort. kew. 1. p. 296

Herba Jutha mea ~~est~~ panem ramosa, tota glabra: caule tereti
foliis petiolata, bipollicari utraque attenuata, integerrima
obscure nervosa. Flores gemini. Calicis lobis setosis. Collin-
culus sesquipollicari striatus

As cleusadi affinis, reliquis foliaceis pappo destituta. Ruy. herb. app.
1903 fide herb. Vaillant.

Papaver corniculatum etc. Pluk. tab. 60. fig. 4.

3 *Urtica* Vincæ caule volubili foliis oblongis Lin. L. V. 252. Am. Acad. 4. p. 309.

Aporhynum scandens foliis foliis, flore amplo plano Catesb. Car. 2. p. 53. t. 53.

Habitat in Carolina.

non ordi.

Echitidis pueras

4 rofea V. caule frutescente erecto, foliis ovato oblongis, petiolis basi bidentatis,
floribus geminis sessilibus. Lin. Spec. pl. pag. 305 +

Vicia foliis oblongo-ovatis integerrimis, tubo floris longissimo, caule
ramos fruticoso Mill. Dict. tab. 186.

Habitat in Madagascaris, Java,

Et nitidulus Caule tereti lavi. Folia petiolata opposita, glaberrima
tenuiter nervosa supra nitida, venella subtus leviter villosa
v. s. tripolliciana, interdum pubretusa cum mucrone. Flores
axillares sessiles gemini

rofea V. caule frutescente, foliis ovali lanceolatis, obtusi