

Viola

45. *Apiciacantha* V. foliis ovalibus margine subterque pulepsi

46. *Diandra* V. caule serpente herbaceo, foliis oblongis, pedunculis unifloris

Memorans

foliis ed. calia, ovata, unguiculata herb. mus.

juvenc. et herb. mus. 1102

caulis plures, eredi, simplicis; sithamoi. Calcar breve obtusum

hispidula Viola foliis linearibus margine scabris, stipulis setaceis, caule fruticeo
80 loco

Habitat in arenosis Guineae West. I.

Stipulus palmatis vel spithameis. Caules plures, ramosi, patentes, superne angulati, que lentis hispiduli. Folia angustissima, semipollicaria, supra glabra, margine carinaque hispidula, scabra. Pediculi axillares, & olitaris, brevissimi.

uniflora Viola Caule unifloro, ~~flor~~ foliis cordatis dentatis Gm. L. Spec. pl. p. 1327 * L. V.
pag. 803. Gmel. Sib. 4. p. 101. t. 48. fig. 5.

Habitat in Sibiria 4

Caulis vix prostratus, nudus, firmus, apice ferens folia tria, subalterna, cordata,
dentata, subvillosa, petioli brevissimi, infidentia. Flores unicuique, pedunculo bre-
vissimo, luteus, foliis majoribus. L. Spec. l. c.

non vidi

Valdenia V. foliis linearis lanceolatis obtusis pubescentibus confertis, ^{radicalibus subrotundis} stipulis linearibus integerrimis

Urolo valdenia erecta herbacea, foliis ellipticis serratis non dentatis, stipulis integerrimis All. fl. pedem. n. 1644. tab 24. fig. 3.

Habitat ~~ad~~ ⁱⁿ Thermas valdenis in saxofis O

Caulis ^{erectus} digitatis striatis angulosis, pubescentis uti tota planta. Folia radicalia orbiculata, caulina congesta alterna comosa, integerrima vel obscure subrepanda. Pedunculi axillares solitarii caule fere dimidio longiores glabrescunt versus summum bracteis binis subulatis alternis manifestis. Calycis laciniis linearis lanceolatis. Calicis subulatum corolla longior. Corolla conuella minor quam in calcarata

decumbens V caulescens procumbens, foliis linearibus confertis Lin. Suppl. p. 397

+ S. V. p. 853

Habitat in Cap. b. p. n.

Caulis filiformis, subramosus, vix frutescens. Folia polliciana, integra
rima acuta sessilia. Stipula minuto subulata, • Pedunculi folia
ori axillares, foliis longioribus bractea basi sinuata in medio
pedunculi. Corolla caulea, calicisata. affinis maxime v. trico
toni Lin.

~~diffinitio of foliis ovatis, serratis~~

integerrimis

non vidi

nummularifolia V foliis cordato ovatis crenatis, stipulis lanceolatis petalis serratis, caulibus
filiformibus effusis

Viola alpina minima nummularifolia B. ord. musc. pag. 163. tab. 127. ^{all.} ^{Spei}
Pedem. tab. 11. fig. 2.

Viola nummularifolia foliis subrotundis ovatis crenatis, stipulis lanceolatis serratis
Vellar. prosp. p. 26.

Viola nummularifolia foliis cordato-acuminatis lobis integerrimis All.
f. Pedem. p. 1640. tab. 9. fig. 4.

Habitat in summo jugo alpium Valdenicisium 2

Caules plures filiformes glabri simplicissimi. Folia longe petiolata ovata subrotunda
basi cordata crenata subtus venosa pallidiora unguiculata. radialis
petiolo 4-5 plo breviora. Stipula caulina dimidio stipula unguiculata
attenuata, in setam. Pedunculi elongati bipollicares supra medium
bracteis binis subulatis oppositis

Ruppia Viola

riphoa V. foliis inferioribus orbiculatis: superioribus lanceolatis fenatis, p
dunculis axillaribus. Hook. fl. pl. 2. pag. 517

michi ex nota

procumbens V. caule decumbente brevifloro, foliis lanceolatis obtusis
obsoletissima seminis Kewher fl. Jul 2. pag 520

michi ignota

Tricolor V. Caule triquetro diffusis, foliis oblongis ^{crenato-fimbriatis} cuneatis, stipulis pennatifidis
Linn. S. V. p. 86. Don. tab. 623

Falca altera Lam. epit. 913.

Viola Tricolor arvensis Bauh. pin. 200

13. *Viola Falca* flor. Trinitatis Camer. epit. 912.

Viola Tricolor horten repens Bauh. pin. 199

Habitat in Europa cultis O

Caules basi ramosi superne triquetri folia petiolata nervosa venosa
unquiculata crenata glabra nisi in venis radicalibus saepe cordata
stipulae in cuneis lance ^{crenatis} basi pennatifida caetera terminali
lanceolata vel cuneata, longitudine foliorum. pedunculi
inter nodos longiora apice bracteis bene minutis
parviflora arvensis Mur. floribus minoribus albis

obs. an grandiflora Lightfooti Guss. et mea potius varietas *tricoloris* est lutea Bauh.
si herb. idcirco a grandiflora removenda & descriptis ab altera que cum cornuta
asulata ad desig. sub grandifl. loco hujus

^{pubera}
pelosa

V. caule diffuso piloso, foliis ovatis serratis stipulis pinnatifidis laciniis
terminali ovata serrata.

Habitat in Gallia

Caeci violo tricoloris Caulis villosus pubescens. Folia altero latere
breviora, serraturis utraque tres vel quatuor obtusi. Stipula
pinnata fere laciniis utraque geminis vel tres lineantibus, termina
li ovata inferne quasi in petiolum attenuata peduncululi caule
altiori

an tricolor panem diversa

microphylla V.

grandiflora V caule triquetro simpliciter, foliis oblongis plicatis, stipulis pennatis pediculis
Mant. 120 & L.V. p. 003

Viola caule triquetro erecto, foliis cordatis crenatis, stipulis dentatis radice
repente Hudf. angl. 331

Viola montana tricolor odoratissima Vauh. pan. 199.

Viola montana lutea grandiflora Bauh. pin. 200 Banel. Tab. 691. 692.

Habitat in Alpibus Angliis, Helveticis, Pyrenaeis &c.

Caulis longitudine digiti intermediis glaber. Folia petiolata in ferora
cordata, obtusa crenata distantia ^{glabra} superiora congesta oblonga obtuse serrata
ciliata uti petioli subnerviularia nervosa. Petioli plani longitudine
foliorum pedunculati interdum gemini alter lateralis caule duplo longior
uniflori bractea bina velus apicem. calix calyce vix longior
Petala lutea

caule triquetro simpliciter, foliis radicalibus cordatis caulibus oblongis ^{obtusis} stipu-
lis pennatis pediculis, calicari nectario longitudine calycis

Planta in herbario sub nomine calicorata grandiflora est secundum
herb. figura Banel.

an aliud quam varietas calicorata (quo huius describitur est lutea) vide H. Sueder
obf.

Lutea v. caule Inguetro diffuso foliis ovatis subcordatis hispidiusculis crenatis stipu-
lis incisè pennatis.

Habitat in Scotia Sed. An. ad Lilia

Viola montana lutea grandiflora Scheuch. in alp. 1 pag. 51.

Viola montana lutea subrotundo crenato folio Ramet. t. 64.

Viola Zoyfi, acaulis, scapo subtriquetro striato uniflora; flore maximo,
nubante flavo; callari subulato, conules, petalis subaequali; foliis
radicalibus ovatis crenatis petiolatis; stipulis lanceolatis cetero
m. Wulf. in Faun. Coll. 4. pag. 297. p. 1. tab. 11. fig. 1.

caulis obscure Inguetro striato. flor. nubant.

subulato

radicalibus cordato subrotundis sub caulino oblongo
caulis nectario longitudine calycis

calcarata V caule abbreviato, foliis subovatis, stipulis pennatifidis, nectariis subulatis caly-
ci longioribus Lin. l. V.

Melanium montanum Dalech. hist. 1204.

Viola alpina purpurea, exiguis foliis Bauh. pin. 199.

Viola caule erecto, pauciflora, foliis ovatis subrotundis, caulibus alpestris, stipulis
pennatis maximis Hall. bot. a. n. 866

Habitat in Pyrenaeis, Helvetiis alpestris Tab. 17.

Caulis vix ullus potius interdum sepius, saepe vix pollicari interdum digitali

simplicis sive exstiti glaber. Folia petiolo v. alia subrotunda, alia

linearia, alia oblonga, crassiuscula avenia nervosa integerrima
vel interdum crena una alterave Peduncululus caulem terminat

uni floris flori magis major quam in reliquis corulea petalis
obovatis. Stipula lanceolata longitudine fere foliorum lacinae utraque

2-3. lineari bus bracteae binae minutoe oppositae aridae in medio pedun-

Viola ^{culis} montana 11. purpureae flore Clus.

Itaque negat caulescere, etiam ^{culis} ultra - Hallerum vero qui grandiflora Lin. Conjan-
git contendit quod tandem caulescere evadet forte cum grandiflora eandem esse
credit ~~in differentia sive medio~~

caule subnullo, foliis subrotundis oblongis lanceolatisve, stipulis pennatifidis
nectariis calyce longioribus

Flor magis quam in grandiflora

folia supra petalis
rationibus longis
petioli ciliati

^{stipulis impunctatis, ovatis, dentatis, reticulatis}
cornuta V. caule elongato, foliis oblongo ovatis, stipulis pennatis pedis, nectariis
subulatis corolla longioribus de n. Spec: pl. pag. 1320x
~~Vallis-onap. Herb. Mat. p. 91. 248~~
Habitat in Gadiis & Pyrenaeis

Caules ascendentes fruticatos debiles simplicissimi. Folia petiolo
sa distantia alterna basi cordata, crenata, nervo collumina inferiora
minora obtusa, nervos venosa secundum nervos pilis adspersa
petioli longitudine foliorum. Stipula latiora quam in ulla alia
longitudine petiolorum basi dentibus aliquot utrinque magnis subin-
cisi, ciliato. Pedunculus plerumque unicus terminalis in
culca una vel altera ex axillis ultimis palmaris uniflori
versus apicem bracteis duobus suboppositis minutis

^{conspici concitata}
Viola pyrenaeica, foliis tenuis fruticosa folio Tournefort cap. 42,
grandiflora gaudet stipulis lanceolatis basi pennatis pedis

arborescens Viola caule fruticoso, foliis lanceolatis integerrimis L. S. V. 803.

Viola montana pumila Clus. cur. post.

~~Viola montana pumila angustifolia, flore inodoro Bauh. Pin. 199~~

Viola hispanica fruticosa longifolia Barr. Fe. 560. Tournef. 7 R. H. 244. 421.

Viola hispanica fruticans Barr. Fe. 560.

Habitat in Hispania & herb. Fuss.

Caulis frutescens, ramosus. Folio pinnolata, bipinnatifida, linearis, sinuata, integerrima, vel remote denticulata, basi attenuata, avenis, nervosa, glabra. Stipula subulata. Pedunculi axillares, solitarii, bipollicares, filiformes, glabri. Flores nutantes. Calycis lobis lanceolatis

21-22. *Stipularis* V caule simpliciter septante, foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris,
stipulis ciliatis; pedunculis foliatis terminalibus Sw. prodr. p. 117.
- Habitat in Andae occidentali; St. Christopher &

non red.

parviflora

V. caulebus diffusis debilibus polyphyllis, foliis ovatis petio-
latis serratis, floribus axillaribus solitariis *Lin. Suppl. pag. 396+*
Habitat in calidis *Aegyptus* America. *Herb. Mus.*

Facies veronicae serpyllifoliae. Radix - cylindrica fibulosa flexuosa
crassitie penno columbina habitu et virtute *Speca. uan. h.*
Caules vix pedales, diffusis, ^{herpiceis} subulosis subrotundis, filiformes basi
ramosi, postea simpliciter, subpescante. Folia opposita serrati-
ni utraque, petiolata glabra venosa, magnitudine Vaccini-
onis. Pedunculi per totum caulem, folio dimidio brevioris
solitarii nudi *Lin.*

~~non vidi~~

Capeensis
alloja V.

Folii oblongis subovatis pubescentibus calycibusque pubescentibus

Habitat in Cap. b. p. ei

affinis *Guffriducosa*. ^{uti tota planta} Caulis teres pubescens simplex. Folia petiolata dente
uno vel altero notata obtusa. Stipula subulata mucronata foliola calycis orata
marginem tenui membranaceo

Vrta capensis Thunb. prodr

exnea sperma Viola caule basi ramosissimo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis distan-
tibus, calycibus postice aequalibus L. O. P. Zeyl. 317. * F.V. p. 803.

Nelam paranda Rheed. Mal. g. p. 117. t. 60.

Herba indica flore monopetalo labio, capsula e rotundo trilaterali octosperma

Raii suppl. 402.

Habitat in India 4.

Rami simpliciflori. Caulis semipedalis. Folia versipetiolata, alterna
stipula nulla. Pedunculi capillares.

Calicolana
berrata V

oppositifolia Viola caule suffruticoso brachiato, foliis oppositis, floribus racemosis L. S. V.

803.

Calicolana caule brachiato glabro, floribus racemosis Loefl. d. 183. *

Habitat in Cumana. f.

non vidi

Hybanthus viola arborescens scandens aculeata, foliis oblongis obtusis glabris Jacq. l. l. v.
pag. 203. Coeff. t. 203. * n. 105. n. 3. Falq. plant. pl. p. 202.*

Habitat in America meridionali.

Arbustula inaequalis, ramosa, erecta, 7 pedalis. Aculei subulati, sparsi, rari. Folia
utrinque attenuata, emarginata, leviter serrata, glabra, petiolata, plura ex
eodem. Corus exigui inodori albi, vix oculo nudo examinandi. Fructus
magnitudine pupae majore

*Speiciuana Viola foliis ovalibus margine pubesque pilosis L. l. v. pag. 804. Suppl. 397. **
Viola grandiflora, serotina folio villosa Barr. Aquar. 113.

Pambalia Speiciuana Vand. f. f. 1771. p. 7. t. 1.

Habitat in Brasilia 5.

Radix alba, fibrosa, ramosa. Caules bipedales, erecti, teretes, laxes, ramosi. Folia alterna, petiolata, elliptica, argute serrata, glabra. Petioli brevissimi. Stipulae breves, scariosae, lanceolatae, carinatae, anfractae, pilosae. Flores laterales, solitarii pedunculati, cernui: pedunculo foliis multo brevior. Bractea in medio pedunculi, brevis, brevissima, lanceolata apice pilosa. Calyx pentaphyllus, margine mucronatus. Petala 5: alba. 2^o calyce breviora, linearia. Duo paulo longiora, reflexa emarginata. unum maximum, rotundum, latum basi gibbum absque calicari latius pubescens l. l. c.

non vidi
*Viola Douglasi Aub. Bot. 310. var. diversa sed eius folia lan. densa et
deficiunt eorum in differentia perhibetur pubes pilosa esse*

dicendum Viola caule serpente herbacea, foliis oblongis, pedunculis unifloris L. S. V. p. 804 *

Habitat.

Caulis filiformis serpens scandens per sepes. Folia alterna remota. Pedunculifolii, sicuti
ciliati, inaequaliter. Bracteis 2. minutis. Calyx persistens minime protrusus. Corolla alba:
Petaleum supremum inaequale maximum, quasi nigrae galeae trifida. Petala latera
alia ascendunt. Petala ^{intima} minora deorsum flexa. horum supremum persistens exsertum rectum
nigrum s. calicis longissimum contortum. Stamina 5. horum 3. anteriora sterilia;
2. posteriora fertilia. L. S. L. C.

non vidi