

Vireta

1. biflora V. foliis ovatis, pedunculis bifloris
2. corymbosa V. foliis lanceolatis, pedunculis multifloris

Virata pratensis, foliis lanceolatis pedunculis multifloris.

Sipanea pratensis Aubl. fl. Guian. pag. 148. Tab. 56.

Habitat in Guiana von Rohr.

Rami teretibusculi, oppositi, adspersi pilis adpressis.

Folia petiolata, opposita, ~~six~~ pollicaria, basi apiceque opposita acuta, in tegerrima, utrinque pilis adpressis adspersa, arena, nervosa, subtus pallidiora.

Petioles brevissimi. Stipula utrinque brevis, lanceolata.

Pedunculi ex axillis supremis et apice, oppositi. Floris quatuor ad sex in apice pedunculi, ~~six~~ pedicellati.

Calyx hirtus, superius: laciniis linearibus, semiunquiculatis, acutis.

Corolla tubus calyce duplo longior, extus raris pilosus: lobis hirsuta.

Limbi laciniis oblongis.

Germen margine coronatum. Stylus superne crassior, longitudine fere limbi. Stigma clavatum.

Serrulata Pennelinia pedunculis axillaribus subsolanis multifloris, foliis lanceolatis
marginibus scaberrimis, vaginis ciliatis.

Habitat in Capena A. v. Kuhn.

Caulis herbaceus, erectus, striatus, glaber

Folia ~~et vagina~~ lanceolata, attenuata, 4 vel 5que pollicaria, gla-
bra, ore fentis margine serrulata.

Vagina pollicares, laevae, ore ciliata.

Spathe lanceolata, attenuata, basi subvaginantem et ciliatam, mar-
gine serrulata.

Pedunculi ^{et axillis superioribus} superne, solitarii vel gemini, breves, radicales longioribus
unquam ulares 5 vel 6 floris, pedicelli ^{breves, inaequales} ~~et longioribus callosis~~

Calycis foliola oblonga, acutiuscula, otulo armato usque pilis raris

Spathe oblonga in anthera pilosissima

biflora V. foliis ovatis pedunculis bifloris

Condalia biflora, caule filiformi repente; pedunculis bifloris

Roebb. Desc. pl. Surinamensium pag. 7. Tab. 2. fig. 2. *

Vireta biflora An. Suppl. pag. 134 * S. V.

Habitat in Surinami humido ☉

Herba tenera, ^{caulis} tetragonis, pubescens interdum radicans, ^{puta}
mors. Folia opposita, petiolata, obtusa, integerrima ^{in petio-}
cum ^{terminum} decurrentia ^{et non} pollicaria. Stipula subulata inter
foliis ^{caulis} parvis. Pedunculus terminalis, inter manus
duos teneros, foliis saepe brevior, flori inferior sespili

Corymbosa V. foliis lanceolatis, pedunculis multifloris

Sipanea gu. patensis Aubl. fl. Gu. pag. 148. Tab. 56

Habitat in Guiana V.

^{internae radiceantes}
Caules ~~erecti~~ ^{interius nulli} teretes, pilosi si abnisiuli ramosi. Folii
breviter petiolata suprema sessilia las nervosa, pilei minuti
ad pappi radi adpressa, subtus pallida, integerrima utraque
acuta pollicaria vel parum ultra. rudimenta foliorum in
axillis. stipula pilosa subulata. Pedunculi terminales
superne pilosi (in mea mult. flores plures in capitulo sessiles)
in figura aubl. pedunculi fol 5-6 terminales uniflori
Habitus spermatocis an versa hujus generis

plena vide inter Desf. Am. Ruanii