

# Viscum

## \* caule folioso

1. album V. foliis lanceolatis obtusis caule dichotomo
2. capitellatum V. foliis lanceolatis, ramis oppositis, baed. capitatis ternis peduncul.
4. neriifolium V. foliis lanceolatis ovatis, ramis brachiotomis dichotomis, floribus  
angulatis ternis fespilibus
3. ~~triflorum~~ V. foliis ovatis trinerviis, pedunculis trifloris ~~floribus~~
5. antarticum V. foliis lanceolatis ovatis, floribus racemosis terminalibus
6. rubrum V. foliis lanceolatis obtusis, spicis lateralibus
7. purpureum V. foliis obovatis, racemis lateralibus
8. verticillatum V. caule verticillato, foliis ovatis trinerviis obtusis
9. ~~floribus~~ <sup>cat. folium</sup> V. foliis ovatis venosis, ~~ternis~~ <sup>ternis</sup> axillaribus utrinque  
ternis, ramis oppositis ternis
10. pauciflorum V. foliis ovatis obtusis enerviis, floribus sparsi solitariis  
caule fruticoso, ramis alternis
11. rotundifolium V. foliis orbiculatis, floribus verticillatis
12. tenestre V. foliis lanceolatis, caule herbaeico tetragono brachiato

\* \* caule aphyllis

13. caper / V. ramis brachyatis
14. aphyllum V. ramis oppositis
15. articulatum V. caule ramisiformo dichotomo subtriquetro, ramis compressis, basi sessilibus lateralibus
16. oppositodorsale caule dichotomo compresso, basi sessilibus
17. radiceatum V. ramis verticibus filiformibus verticillatis

17 radicatum Vitaceum aphyllum ramis scissiformibus verticillatis

visium ramulis et foliis longis densis sternatis et radicatis

Sloan hist. Tab. 201. Tom. 2. pag. 93.

visium aphyllum, basibus aureis umbellatis Plum. Spei.  
17. ii 250. fig. 1.

Habitat in America

Rami ternati, longitudinaliter rimosi; elongati, sape  
quaternati, verticillati, terni vel quini, superiores  
semper breiores.

Cacti species

Flavens Viseum foliis ovatis venosis racemis axillaribus utrinque ter-  
niis glaberrimis Sw. prod. pag. 32.

Rami teretes, articulati, oppositi, sub geniculo dilatati, inferne respu-  
squama opposita, minuta, ovata.

Folia petiolata, opposita, bipollicaria, apice attenuata, undulata,  
coriacea, acuta, obscure nervosa.

Spicae axillares, plures, verticillati, subtripollicares, per inter-  
valla squamae opposita, distantes, ovatae.

45 floribunda R. <sup>complexibus</sup> folio pedunculis unifloris, foliis abscispe pennatis  
petioli stipulisque inermibus.

Habitat in Insula S. Thomae & West 5 <sup>Linneo</sup>  
Rami teretes glabri. Lignis purpuriscentes punctati  
glabri. Folia pennata cum pinnis 9-10 jugis plerum  
que duo vel 3 gemma protenti anni in ramis  
junioribus solitarii digitales. foliola breviter  
petiolata opposita glabra, oblonga, mucronata  
glabra unguiculata intima parum minor.  
Stipula lanceolata attenuata inermes flexiles.  
Pedunculi 4-5 & singula gemma capillares sub  
flore articulati ad calycem. Calyx cyathiformis  
glaber integer gemmae glabrum corolla purpurea  
fere magna unguis petalorum longitudine  
calycis

Robina

radicatum V. aphyllum ramis teretibus filiformibus verticillatis  
Sisum aphyllum, Batis auresi umbellatis Plum. Spec. pag. 17.  
G. pag. 255. tab. 250. fig. 1.  
Sisum ramulis et foliis longi decursus gematis radiatis Rouss.  
hist. 2. pag. tab. 201. fig. 2.  
Habitat Surinami et Guayana  
Rami teretes a thiculis inferioribus pithamais superioribus  
brevibus verticillati 3-5. 7. nervi.

Cactus pedunculatus Swartz

obliquum Sifium foliis ellipticis glabris, caule fruticoso Thunb. prodr pag. 31.  
Habitat in Cap. b. frei

non redi

*sessifolium* Vestium <sup>ramis oppositi</sup> foliis ovatis oblongisque nervosis, spicis axillaribus sedita  
ris.

Habitat in Insula Martinica.

Rami: teretes, flavi, juniores, compresso tetragoni. Folia opposita, subsessilia,  
coriacea, inferna tripolliciana, utrinque attenuata, quinque nervis, acide  
ramulorum oblonga, obtusissima, basi attenuata. Spicis folio brevis.



*Cotifolium Vesium*

Habitat herb. in Maritimi &  
Rami glabri, teretes, superne compressi. Folia petiolata, opposita, tripollida  
nisi, oblonga, obtusa, coriacea, cespitia. Spica axillares, geminatae, erectae  
longitudine folii. Flores 3-4-naque. Fructus reflexus

geni stelloides Vespium

①

Habitat in India Orientali herb. Guaf.

Cauli inferne teres. rami oppositi, demum duobus, compressi, striati, lineares.

Flores ad articulos sespites, solitarii

• *Legustinum Viseum*

*Viseum americanum* *Legustinifolium* Vaillart

Habitat in America. Herb. Mus.

Rami tetragoni, glabri. Folia subpetiolata, sesqui pollicaria, lanceolata, obtusa, basi attenuata, obsolete trinervis. Spica axillaris solitaria, opposita, semi pollicaris.

*Viscum*

*Viscaria Commesa*

Habitat in insula Bourbonia Commes. herb. mus.

Rami dichotomi, inferne teretes, superne compressi, glabri. Folia subpetiolata, sesqui pollicaria, ovata, obtusa, obscure trinerviâ, suboriacea, basi ovata acuta, pedunculati axillares, solitarii, brevissimi, triflori. Baccae magnitudinis Piperis

*tanoides* Vign.

Habitat in Madagascar Comme herb. Ausp.

Articuli compressi obovati, apice articuli plures angustiores.

In nervum Vifium La Mark

an verticillatum Lin.?

Habitat herb. Gussf.

Rami oppositi, compresso tetragoni, ad folia dilatati, glabri. Folia petiolata, opposita, pollicaria, lanceolata, obtusa, basi acuta, arena, enervia, subtus obscure tri nervia. Spica axillares, solitariae, vix semipollicares

Vifium

Habitat in Guayaco herb. mus.

Rami a linea a petiolo decurrente angulati, glabri. Folia opposita, breviter petio-  
lata, sesquipollicaria, lanceolata, acuta, integerrima, <sup>super</sup>obscure venosa. Petio-  
lus subtus carinatus. Pedunculi axillares, cinerei, semipollicares, subtetragonii.  
Flores oppositi, sessiles, ciniter 6. Calyx griseus, dentatus.

*beni folium Vicium*

Habitat in America herb. Gusf.

Rami tetragoni, ad folia dilatati, superne compressi. Folia subpatulata, semipollicina  
ria, obovata vel oblonga, conacea, obscure trinerviâ, avenia. Spica axillaris,  
solitaria vel gemina, folio triplo breviorer.



Viscum

Habitat in Carolina herb. La Martini

Spica opposita, raro gemina in altera axilla

*portulacae copuleum Vesperum*

Habitat Commarum herb Messai

Rami sulcati, compressi, oppositi, glabri, ad folia dilatati. Sola petiolato, ovata, obsoleta trinervi, subcordata. Petiolus semiunguicularis. Spica axillares, petiolo longioribus. Baccis confertis, cruciatis, racemose, parvis, alevato punctata.

1 album Vfoliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo Lin. l. V

Sisium Pam. epit. 555

Sisium baled albis Baud. pin. 423.

Habitat in Europa arboribus &

Rami dichotomi teretes cortice rugoso. Folia petiolata  
opposita, basi in petiolum attenuata, integerrima enerv  
vici glabra. <sup>sup. pellucida</sup> Baccis sessilibus ad axillas geminis

lat. folium  
flavens  
flavens

<sup>sub</sup> V. foliis ovatis venosis, spicis axillaribus utraque Ternis, ramis  
oppositis verticibus <sup>sub</sup>

Vitisum aliud racemosum, foliis lato semis Plum spic. 92;  
pag. 256. tab 250. fig 4.

Habitat in peruviana et India occidentali

Rami teretes, oppositi, laxes articulis utrinque crassioribus. folia  
breviter petiolo opposita bi- tripolliciana <sup>utrinque</sup> acuta oblique venosa coracea  
pilis axillaribus sessilibus crassis brevissime pedunculata bipolliciana utri-  
que 3-4. Rachis articolata articulis unguiculatis apice bifido caris  
floris floribus confertissimis verticillatis 3-4. pappula in foraminulo rachidis

Vitisum flavens foliis ovatis venosis, racemi axillaribus utraque  
ternis quaternisque Sw. prodr: pag 32  
adde syn: Luandei

~~capitulum~~ Viscum foliis obovatis, capitulis axillaribus oppositis

Habitat in ficu religiosa Ind. Orient.

Habitus Rami oppositi, articulati; articulis pollicantibus.

Folia sessilia, pa' opposita, carnosa, pollicantia. Supra inferora latiora  
 sed obovata

Peduncululi axillares, plerumque solitarii, oppositi, rarius gemini ex altero  
 axillo, foliis breviores

Florae quae 3-4 quatuor, sessilis.

Basia parva

v.

Sloam. Tab. 201. fig. 2.

Habitat

herb. Guaf.

Radix dichotomi, compressi loric. Tenues. Folia subpetiolata, 6-8.  
lineana et angustissima, ex dorsum latera, polliciana vel  
brevisora apice trif. 3. fedi (an ramuli) flores axillares vel  
terminales, minuti, sespiles.

Glomerata. Eq. fruct. foliis glomerati.



1) verticillatum V. caule verticillato, foliis ovatis trinerviis obtusis An. 1. V

*Lippium portulacis* foliis; baccis croceis et racemosis Plum. spec.  
17. cc. 250. fig. 2.

Habitat in Jamaica. (corrected name)

~~Caulis teres, rami verticillati terni, tetragoni glabri. Folia coriacea opposita, <sup>petiolata</sup> glabra, integerrima ovata, oblonga trinerviis nervi autem superne evanescentia, quibus axillares solentur vel gemini folio duplo breviora.~~

Loane 201. fig. 2

~~Rami dichotomi, compressi lati. Venae. Folia petiolo~~

mea forte edwda

naudi



7 purpureum v foliis obovatis racemis lateralibus. Lin. 1. v

Sisium foliis latioribus, bacis purpureis, pediculis infiden-  
tibus. Cat. Syst. Car. 2. p. 95. f. 95.

13. Vespum bacis nives racemosis, foliis basi luteis Plum  
Spec. 17. t. 250. fig. 3.

Habitat Bahamae

rubrum V. sp. foliis lanceolatis obtusis, spicis lateralibus. L. S. V. p

Rami flavescentes, angulati, oppositi, articulati, ramosi.

Folia sesquipollicaria, basi attenuata, glabra, integerrima, pallide  
viridia.

Spicis axillaris, bipollicaris, articulata: ~~Baccis oppositis, sessilibus,~~

~~remotis, inter singulum par squame ovato, oppositis, acutis, par  
vo basi emarginata vel~~ articuli apice utriusque dilatati bifidi:

laciniis ovatis, acutis.

Baccis oppositis, sessilibus.

axillaribus solitariis

an eadem cum macrostachyo Jacquin

rubrum *V. spum* foliis lanceolatis obtusis, spicis lateralibus her. N. V. pag.  
883.

Rami oppositi brachcati teretes siccis flavescentes

Folia lan opposita pollicaria lanceolata vel lanceolata oblonga  
basi in petiolum angustata

Spicis axillares; oppositi solitarii folio duplo longiores <sup>articulis</sup> ~~articulis~~  
pedunculati pedunculus apice membrana basin spicis complexa  
basi bifida acuta

Flores oppositi vel alterni

Andanthicum Viscum <sup>ellipticus</sup> folio lanceolato ~~ovatis~~, racemis terminalibus

Habitat ad fretum magellanicum Dr Prof. Fabricius.

Rami oppositi filiformes, teretes, glabri, cortice cinereo

folia petiolata, polluciana, utraque acuta, <sup>subterminalia</sup> glabra, integerrima

pedunculus terminalis, solitarius, erectus, unguiculatus; pedicelli  
plures, versus apicem pedunculi, approximati, filiformes

penyulatum <sup>oblongo</sup> <sup>basi acutis</sup> <sup>axillaribus</sup>  
Triflorum Vesum foliis ovatis trinerviis, pedunculis trifloris

Habitat in India orientali

Caulis et rami sexangulati, glabri. Rami oppositi simpliciter, interdum  
ultimi bifidi, articulati: articuli bipollicares, apice parum dilatati  
Solcia opposita, basi in petiolum planum brevem desinentes, pollicia  
rigida, undulata, glabra, trinervia, nervi apicem haud attingen-  
tes, obtusa obsolete venos

Pedunculi axillares, brevissimi, solitarii

Bractea ter, seorsim, in apice pedunculi, oblonga, acuta, mucronata

(Habitus Vesicæ verticillati)

2 capitellatum V. foliis <sup>ramis oppositis</sup> ~~concreatis~~ <sub>pedunculatis</sub> baccis pedunculatis capitatis femis

Habitat

~~Car. Saecis fere Vitis: utriusque albi. Rami teretes glabri  
oppositi articulati articulis pollicariis apice  
paucum dilatatis. Folia crassa, opposita pollicariis  
basi attenuata subfolia integerrima superiore  
sem minorum peduncululi axillares oppositi inter  
dum gemini utraque folio breviores baccis  
tres vel quatuor sepius oblongi parvi.~~

Nereifolium visum ramis trichotomis dichotomis, foliis lanceolato-ovatis,  
floribus ternis sessilibus

Habitat in Madagascaria Du Thouin t. ex p. 10  
Rami teretes, primum trichotomi dein dichotomi, Congiunturaliter

<sup>rimosi</sup>  
Folia opposita, basi attenuata, subsessilia, sequi pollinaria, pa-  
substantia congenerum, obsens evidentiores, tri vel quin-  
que nervia, saepe altero margine convexiora, superne pa-  
rum attenuata, obtusiora vel acutiora.

Baccae tri, sessiles in ramis ad ramificationes, in ramis ultio-  
rum terminales, six magnitudine peperis, oblongae, um-  
bilicatae, stylo persistente terminatae; squamae duae,  
parvae, flavescentes, ad basin singuli

*Cynosuroides* Poa panicula ~~fructa~~ pyramidalis, pedunculis patentibus, spicis  
caudantibus ~~difficilis~~ Retz. off. 4. p. 20.  
Habitat in aridis ~~Penlombis~~ Indis orientali

est. *Uniola bipinnata* L.



capitellatum Vespa foliis cuneatis, ramis oppositis, bacis pedunculatis capi-

tato pernis

Habitat in Sicilia religiosa Indico orientalis

Rami teneres, glabri, oppositi, articulati: articuli pollicares, apice  
parum dilatati.

Folia crassa, opposita, pollicaria, basi attenuata, subsessilia  
integerrima. <sup>susum versus sensim minora</sup>

Pedunculi axillares, oppositi, interdum gemini, utroque folio  
brevior

Bacis tres vel quatuor in apice pedunculi, sessiles, parvi

(Lacris Vesic albi

expansa Poa: panicula patentissima capillari pedunculis ~~vesticillatis~~ <sup>at illis</sup>  
barbatis, ~~quibus lanceis~~ 10 floris vaginis punctatis pilosis

Habitat in Isle de France ..

Culmi

affinis capillari. Gramen pedale, vaginatum vaginis foliorum

et ceteris. Solca involuta subulata suprema planiora ~~extus~~ glabra  
intus pilosa. Vagina subtilissime striata versus marginem  
punctis <sup>parvis</sup> numerosis cui insident pili longi. Laxa barbat-

Pedunculi tres ad singulum geniculum simplicissimi bi-

si tripollicares superiores ut flouosi capillares uti pedicelli

pedicel <sup>basis</sup> pili longi cani nudi ad basin pedicelli pollicares  
vel <sup>longiores</sup> pollicares alterni remoti uniflori. Spicula line-

ares 10 flori. Calyx parvus purpureo liliis. floco pallide flori  
quod <sup>post</sup> deorsum dilute purpureo liliis <sup>specie</sup> obtuso subaristatores co-  
ma <sup>un</sup> versus basin gibbosi subulsi <sup>semine</sup> fusio translucente

Opuntioidei V. caule proliero ramosissimo aphylo compresso Lin. P. V.  
V. Opuntioidei ramulis compressis Sloan. Jan 160. Hort  
2. p. 43. t. 201. fig. 1.  
Habitat in America 5

\_\_\_\_\_ Dichotomo compresso <sup>aphylo</sup> baccis piceis

non vidi

excludi syn. Plum

14' articulatum <sup>Vissum</sup> caule ramoso <sup>apophyllo,</sup> pinnis dichotomo <sup>ramis</sup> subtriquetro

compressis, basi sessilibus

Vissum articulatum caule triquetris articulato, ramis planis  
sessilibus ad gemacula sessilibus Burm. Ind. pag  
pag. 311.

Habitat parasitica in variis arboribus Zeylone Malacca et Siam

Caulis altero latere plano altero ~~convexo~~ utrinque  
ala decurrente. Rami dichotomi, articulati; articuli

inferiores sesqui vel  
bis, pollicis dictus

linearibus, bipollicantibus, striatis, inferne versus parum  
attenuatis, glabris, <sup>et</sup> ultimis pollicantibus.

Bacca magnitudine seminis Coriandri, solitaria vel  
gemina, utrinque, <sup>et</sup> apice <sup>apice</sup> articuli ad latera articulationis  
infra ramulos, solitaria vel gemina basi membranacea  
resistente cincta sessilibus.

14 Forthalsi  
aphyllum

Viscum aphyllum rami oppositi. Veretibus  
Viscum Forth. fl. arab. n. 5 80

Habitat in Arabia Forth.

Habitus Visci: albi at aphyllum nec dichotomus. Rami Veretibus,  
simplices, oppositi, inferiores pithamoi, superiores sesqui  
minores, articulati. articuli pollicum longi, inferne verpi  
vix angustati, glabri.

Bacca solitaria, vel gemina, opposita, magnitudinis pisi,  
super umbilicata, mucronata & pedicello persistente,  
sessilis, basi nonnulla squama obscurae, rubra  
~~Color rubro-gaudeat~~ secundum Schedula Forth.

an Dra cum capite specimen vero sub hoc nomine  
a Dallas museum Congo diversum

13 copense V. aphyllum, ramis brachiatis dea Suppl. pag 426. & L. V. pag. 883.

Habitat in Cap. b. spei arboribus. & in tumulis oxycedro  
Inter lignos ramosissimus brachiatus articulatus; cortice lon-  
gitudine meliter subuzo, articulis singulis dentibus apice  
in squamam obtusiusculam deprente, perfecte ut in Salicornia  
herbaria, cui figura admodum accedit. Folia nulla  
Ballo lateralis, opposita, saepe tres simul, sessile, magnitudi-  
ne Arbuti, cum stylo cylindrico brevissimo, stymate obtuso  
cui circumscritta areola cincta margine tetragono, brevi,  
ut quadrifido len.

Specimen ex Ligno vidi in herb. Desfont an dwerpen  
Caulis digitalis ramosi, rami angulati oppositi. Squama loco foliorum  
duo, ovato carnosae opposita obtusa, connata. Flores parvi sessile  
solitarii oppositi.  
Similem a St Domingo ad magis ramosum. Squamis acutis an varietas?  
V. specum oxycedri Obus?

Differentia haud bona, diversa ab insequente nota non deservitur

12 Terrestre V. caule herbaeico tetragono brachiato, foliis lanceolatis Lin

Spei: pl. pag. 1452.

Habitat in Philadelphia pratis subhumidis

Caulis herbaeicu pedalis, teris, ~~brachiatus, tetragonus~~. Folia  
reticulata teris, integerrima arena: inferiora minor.

Spica axillari sessile carnosae oblongae. an Coranthis

species

non vidi

macrostachyum foliis cuneato lanceolatis spicis axillaribus oppositis longioribus  
Sicun macrostachyum foliis linear lanceolatis; spicis axillaribus filiformibus  
nibus Gaiqu. coll. pag. 109. tab. 5. fig. 3  
Habitata in Armenia meridionali;

Rami tenues flavescendi. folia opposita crassa ovata obtusiuscula  
basi attenuata pollicaria. Spicis axillaribus oppositis ~~et~~ pedunculatis  
articulatis adnatis apice campanulato brevi. flores ~~et~~ foeminei oppo  
siti. Calyx triphyllus superius laciniis ovatis

an eadem cum nubo



Flabelli forme *V. corymbis simplicibus*, *Folius deltoidibus apice fennatis* Hort Kew. 3. p. 167  
Habitat in Cap. b. spec. 5.

11 rotundifolium V. foliis orbiculatis, floribus verticillatis Lin. Suppl. p. 426.

S. V. pag. 103

Habitat in Cap. b. p. rei

non vidi

10 pauciflorum V. foliis ovatis obtusis enerviis, floribus paucis solitariis, caule  
fruticoso, ramis alternis Len Suppl. pag. 426. t. V. p. 003  
Habitat in C. b. p. c. 1/2  
Cana quamvis non tomentosa.

non vidi

myrtalloides V. foliis oblongis subtrinerviis obtusissimis, spicis axillaribus oppo-  
sitis ramis tetragonis

Habitat in India occidentali

Caulis teres glaber lavis. Rami oppositi simpliciter tetragonis.

Folia petiolata opposita oblonga, ut polliciana basi acuta  
apice obtusissima, saepe emarginata cum mucrone minuto, obtu-  
sa trinervia.

Spicis axillaribus foliis brevioribus solitariis opposita flores frequentes  
accedit ad Plam. fig. Ic. tab. 250. fig. 2. vel 3

Raspi

marginata ?

e Cayenne 22 d. Arch.