

Vitex

Linceo Sandelli huc pertinet

1. ovata V. foliis simplicibus ovatis; subtus incanis, paniculis terminalibus ^{trichoto} ^{compositi}
2. latifolia V. foliis simplicibus oblongis, subtus incanis, racemis terminalibus
3. argentata V. foliis simplicibus ovatis acuminatis inferius ^{incanis} ^{ternatis}
4. agnus castus V. foliis digitatis lanceolatis subtus incanis integerrimis serratis ^{ve in serratis incisive, spicis racemosis}
5. trifolia V. foliis ternatis quinatis que lanceolatis integerrimis subtus incanis spicis racemosis trifidis.
6. negundo V. foliis quinatis ternatis que serratis, utrinque nudis, floribus ^{tomentosis}
7. pubescens V. foliis ternatis ovatis subtus pubescentibus paniculis trichotomis bracteis longitudine calycum ^{to}
8. leucoxylon V. foliis digitato-quinatis glabris, folioli petiolatis oblongis integerrimis paniculis dichotomis, basi monospermis

- ^{capitata}
#0. *divaricata* V. foliis ternatis integerrimis glabris: terminali maximum, pari
culis dichotomis divaricatis.
10. *altissima* V. foliis ternatis integerrimis utraque glabris pinnis racemosis
bifidis, basi inferius
- # 11. *umbrosa* V. foliis quinatis integerrimis, utraque glabris, racemus com-
positis axillaribus
- ^{truncata}
12. ~~pinnata~~ V. foliis alternis ~~pinnatis~~ ~~quinatis~~ ~~pinnatis~~ ternatisque
obovatis ~~foliis~~ obovatis *Agleia* *lewis*

Vitex undulata / *Bankii* *V. pinnata* Lour.
alata

obtusifolia. Viter foliis quinatis digitatis oblongis obtusis glabris, ^{aniliis} pedunculatis
dichotomis

Habitat in Guinea Isid 5

Arboreus. Rami tetragoni, supra alternatim compresso-tetra-
goni, glabri. Folia petiolata, opposita, quinata digitata: foliola
petiolata oblonga, intermedio majora bi-tripollicaria, lateralia per-
4 Petioli beniamina minora, oblonga, basi acuta, apice obtusa, integerrima, utrinque
ca nalicula glabra, obsolete serrata, transversim ramata subnervosa. # Pedunculatio
4, 4-5 polli cares et terminali, ^{pluritate} dichotomi, cum flore pedicellato in axillis dichoto-
cares. miis. Flores pedicellati, tomentosi, uniani. Bractea subulata utrinque
ad basin ramorum, decidua. Calyx monophyllus, campanulatus, 5-que-
dentatus, persistens. Corolla calycis duplo longior, 5-petala, 5-quefida
laciniis oblongis, unica majore. Filamenta 4. Versus basin tubi inserta
longitudine corollae, ~~quorum~~ duo parum longiora. Germen superum oblon-
gum glabrum. Stylus unicus, subtrifidus
affinis leucoclylo. emendatus character leucoclyli

Edinifolia Vitis, foliis per ternato pinnatis duobus terminalibus oblongis paniculis
dichotomis, flombus tomentosis

Habitat in Guinea 4 ped. 5

Caulis arboris, rami teretes, glabri, superne crassitie penno cygnis.

Folia petiolata, versus apices ramorum, foliola terna, unicum
inferius, duo terminalia, lat. petiolata, tri vel quadri polliciana,
late oblonga, obtusa, basi acuta, integerrima, rigidiuscula, utrinque
glabra, supra obscure remote nervosa, subtus tenax serosa. Petio-
lus communis supra planus, ^{ad folium danti dilatatus} peduncul. ad apicem, bi pollicares
compressi, glabri, scis dichotome divisi. Bractea subramifica terni-
bus, setaceis. Pedicellus nullus in dichotomia. Calyx campanulatus
obsoleta dentatus. Corolla parva.

alaba Viten

Rhed-hot Mal. 5. Tab. 1-1.

Habitat in India Orientali herb. Proxima

Folia ternata vel quernata Pedunculi ramis trifidi, psithemai: pedicelli
ruicemof oppositi, unguiculati, saepe bipartiti. Calyx cinereus. fructus ferus
sub quinquefidus. Fructus Pijere negro micat.

Vitex

Brown 267.

Habitat in America herb. frus.

Folia septenato-digitata: foliola petiolata, intermedium 3 pollicare, reliqua sensim minora, lato oblonga, obtusa, integerrima, subcoriacea, utrinque glabra, tenuissime venosa, supra nitida. Racemi axillares: pedunculi ^{ramul} bi bifidi cum flexu pedicellato in dichotomia. Calyx dentatus, glaber. Corolla incana an eadem ac umbrosa

V. tex.

V. tex. paniculata de Marsh.

Habitat herb. Tusf.

Rami incani, uti folia subtus et panicula. Folia quinata vel ternata: foliola
bisquipollicaria, lanceolata, integerrima, attenuata: Petioli partiales fere semi
pollicares. Panicula ramis dichotoma. Calyx incanus, 5-fidus.
Foliola interdum basi ovata, attenuata, 4-5 pollicaria
an a trifolia diversa?

Tomentosa Vitex

Habitat in Brasilia Herb. Guss.

Rami crassitie penna cygneo, compressi, superne flavo villosi. Folii petiolata, tera-
ta: foliola subsessilia, bipolliciana, oblonga, lateralibus parvis minoribus, integerrima,
acuta, utrinque flavescenti tomentosa, supra nitida, avenia, subtus nervis
obscuris venosa magis villosa. Petiolus flavo-tomentosus, bis. tripollicianus. Pa-
dunculi axillares, petiolo breviores, oppositi, bis. & trichotomi: rami divaricati.
Flores pedicellati. Calyx campanulatus, quinque dentatus. Corolla unguiculata,
interior glabra, ad filamenta villosa.

Sorte Lina Vandelli

parviflora Viter folior ternatis: foliolis ellipticis subtus villosis, paniculis axillari-

bis
Habitat in Philippinis herb. Mus. f.

Arborescens. Rami glabri: ramuli iniani. Folia petiolata, uti foliola: foliola qua-
drupollicaria, lateralibus parum minoribus, ellipticis-lanceolatis, attenuatis, integris-
sima, supra glabra, obsolete venosa, subtus pubescentia, vix venosa. Petiolus commu-
nis tri-vel quadrupollicaris, purpureo-roseo: pariter semipollicares. Panicula axilla-
res, petiolo parum longiores, iniani. Flores parvi. Paniculae ultimi subdichotomi.

divaniata Vitex foliis ternatis integerrimis glabris; terminali maximo, paniculis

Dichotomis ^{irregularit.} divaniciatis Symb. bot. 2. pag. 76.

Rami super costis albidis, superne ~~adternatim~~ ^{adternatim} compressi, ad folia tria
Iniciis dilatati: ramuli foliosi et floriferi, fusco purpurascetes; com-
pressi, apice flavido-pulverulenti

Soliola venella flavo pulverulenta: foliolum intermedium interdum

obscure emarginatum
Calyc campanulatus; obsolete dentatus

Habitat in Montserrat An Ryan 5

puncticulata Vicia

Habitata Gava herb. huj. 5

Rami tetragoni, canescentes. Folia petiolata, ternata. Folia petiolata, ternata.
foliolo petiolata, ^{latencia prope minor} tripolliciana, elliptico-ovata, basi sensu parum angustata, in
tergemia, venosa, utraque glabra, costis fectis est ceptis, supra vculo armato
puncticulata. Petioli canescentes. Panicula terminalis, canescens: partiales
in lacerno composito bis bifidus cum flore sessili in duobus tonia

reticulata V. Steud.

Habitat in Tava? Herb. Mus.

Rami tetragoni, crassitie penna cyneo, superne canescentes. Folia petiolata, Vernata: foliola petiolata, 3-4 pollicaria, elliptico-ovata, acuminata, intermedia tenuissime venosa, basi acuta, supra scaberrima, subtus villosa. Panicula terminalis, pedicellis ultimis bifidis. Flores secundi sespites iniani. Bractea lanceolata, calyce longior. Baccis magnitudine pipenis nigri.

ovata ✓ foliis simplicibus ovatis Thunb. fl. jap. p. 257. Fl. V. 570
Vitis rotundifolia: foliis simplicibus ovatis integerrimis, pedunculis
axillaribus solitariis unifloris brevissimis. Lin. suppl. p. 294*
Habitat in Japonia ✓
Caulis repens, rami tetragoni inaequalitomentosi, erecti, pedales
folia decussata, petiolata, obtusa integerrima, supra vincta
mollia, albo tomentosa, pollicaria. Petioli canaliculati.
Flores in summitate ramorum, primum axillares, tandem termi-
nales, panicula ^{pauciflora} trichotoma, brevissime pedunculata. Bractea
sub parva panicula trichotomia filiformes tomentoso len-
gitudine ^{pedunculata} pedunculata. Corolla tubo torcentosa, intus purpurea
Bacca globosa facie ripens albi Thunb

non vidi

Cal. Perianth. 1 phyllum tubulosum ^{pollicare} limbo ~~am~~ limbo ampliato, subbi-
lobatum. Labium superius bifidum laciniis lanceolatis acutis
venoso reticulatis inferius trifidum laciniis pinnatis modo
brevioribus et angustioribus

Corolla labiata ⁱⁿ ~~flexida~~ ^{lobis} superius subrotundum. ^{major} lateralibus 4
oblongis inferius parum minoribus

Stamina filamenta 4. basi villosa. anthera didyma

Stylus longitudine corollae stigmata duo. Ovarium supra villosa aurium
subglossum

Vitex

Vitex triflora, foliis ternatis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque trifloris.

Habitat in Cayenna von Rohr 5

Rami inferne teretiusculi, glabri, purpurascens, superne tetra-

*Vitex, interdum
arborescens. Corolla
Coerulea, faucibus
barbata. Bractea
ovata coriacea, Nux
quadri-loculari
Richard*

goni ferrugineoque subpubescentes, articulati: articuli bipolli-

Folia petiolata, ternata: Foliola brevissima petiolata, bisese-
ad quinque pollicaria, lateralia parum minor, elliptica
lanceolata, extrosus ^{acumine obtusiori} basin versus sensim parum
angustata, acuminata, venosa, utrinque glabra, integri-

Petioles purpurascens, supra canaliculati, sesquipollicares, apice aureo-tomentosi.

Pedunculi axillares, oppositi, solitarii, terminaliter gemini, longitudine petiolorum, compressi. Pedicelli terni, uniflori, semipollicares; intermedius brevior. Bractea duo setacea, ^{versus} ~~versus~~ apicem et ad basin pedicellorum lateralium ^{verte}

Calyx infundibuliformis, fere pollicaris, bilabiatus. Labiū superius bifidum: laciniis ovato-lanceolatis, acutis; inferius minus profunda sedum, trifidum: laciniis ovatis, acutis, omnes senos, oculo armato pilis raris adspersis, indurissimis.

Corolla monopetalala, calyce duplo longior, extus aurescente-tomentosa, intus ^{duo superioribus, ovato, sacis, duo inferioribus oblongo} glabra, quinquefida: laciniis ~~quatuor oblongo~~ ^{robustissimis}: quatuor intermediis inferioribus subrotundis, reliquis triplo latioribus, dentato-subincis-

^{sa}
Stamina. Filamenta quatuor, tubo inserta, villosa, corolla parum breviora; duo parum breviora et angustiora. Anthera globosa, fusca.

Pistillum. Germen superius, inferius glabrum, fuscum, apice aurescente villosum, subglobosum. Stylus filiformis, longitudine corollae, glaber. Stigma bifidum, acutum.

(Calyx parum diversus a congeneribus; corolla vero eadem. Fructum non vidi)

Vitex capitata, foliis ~~quinto~~ ^{quinto} digitatis: foliis lanceolatis glabris integerrimis,
floribus capitato-subumbellatis
Habitat in insula Trinitatis Ryan. 7

Arbor mediocri

Rami teretibusculi, cicatricati, ad cicatrices parum dilatati et
tetragoni, glabri, cortice cinereo, laves: ramuli foliosi
et fliferi, inferiores alterni, terminales saepe terni, alter
natim compressi.

Folia ad apices ramulorum; opposita, approximata, glabra petio-
lata, patentia: foliola quinque, tenera, intermedia petiola-
ta, extrema sessilia, quadri-pollicaria, lateralia sensim
minora, ^{omnia} lanceolata, attenuata, integerrima, utrinque
acuta, venosa, glaberrima.

Petiolus bi- sive tri-pollicaris.

Pedunculi axillares, solitarii, longitudine petioli, glabri,
tenues. Flores sex ad duodecim in apice pedunculi,
primum sessiles, demum brevissime pedicellati. Bractea
non nullo minuto ad basin calycis

Calyx, uti corolla, villosus subsericeus, persistens, monophyllus, subamplicatus
latus, quinque dentatus: fructiferus quintuplo major, hemisphaericus,
glaber, venoso-subreticulatus.

Corolla unguicularis, labium superius bifidum: laciniis oratis acutis; inferi-
us trifidum; lacinia intermedia majore subrotunda, crenulata, late-
ralia figura et magnitudine reliquarum. Fauis villosa

Drupe ovato-oblonga

Stylus longitudine, corollae. Stigma bifidum

Drupe ovato-oblonga, ^{nucula} submucronata, piceo duplo major. Pericarpium qua-
driloculare: loculis monospermis.

Catifolia V. foliis simplicibus oblongis subtus incanis, racemis terminalibus compositis

Habitat

Fabrius 3
~~de Rayoni~~

integerrimo

Rami superne cani. folia petiolata opposita pollicana
supra glabra. Racemus terminalis pedicellis trifloris.

Agnus castus V foliis digitatis serratis, spicis verticillatis Lin. t. V.

Videtur foliis angustioribus cannabis modo dispositis Bauh. pin. 475.

β. *Videtur* latiore folio Bauh. pin. 475.

Videtur folio serrato Bauh. hist. 1. p. 205. Lib. 4.

Habitat in Sicilia, Neapoli paludosis inque Barbaria;

Rami superne tetragoni incani molles tomentosi. Folia petiolata

opposita digitata foliola inferiora patena in superioribus
sunt ^{suprema} serrata, ^{petiolata} ^{foliola} ^{inferiora} ^{patena} ⁱⁿ ^{superioribus}

undia, ^{subtus} ^{molliora} ^{incana} ^{nervosa}. integerrima in β serrata
missa. Racemus terminalis brachiatus & spicis oppositis multifloris

Calyx uti corolla extus tomentosa incana genitalia corolla

Congrua ^{habetur}
β etiam a Tournef. uti varietas, foliis integris etiam videtur. huc Tournef.

integerrimis in cisis & spicis in racemis com-
posito

Trifolia V. foliis ternatis quinatisque: foliolis ovatis acutis integerrimis subtus
canescentibus panicula rachi cetera pedicelli dichotomis Lin. Suppl. pag.

273. l. v. p. 579.

Vibex trifolia foliis ternatis quinatisque integerrimis, panicula dichoto-
mis Lin. l. v. p. 489. Spec. pl. p. 898

Piperis semilis, fructus striatus, semina Bauh. pin. 412.

Vibex trifolia minor India Plukh. alm. 390. t. 206. fig. 5.

Caranofi Rheed. Mal. 2. p. 13. t. 11.

Lycopodium vulgare Rumph. amb. 4. p. 40. t. 10.

folia alii

simplicia

oblonga in

herb. la Martii

vidi.

Habitat in India &

Rami superne tetragoni incani. Folia petiolata opposita foliorum
oblonga, attenuata integerrima vel dente uno alterove
subtus tomentosa incana mollia supra glabra nervosa
intermedium bipollicare petiolatum lateralibus minoribus
fissis. Racemus inferne utrinque ramo. Specie opposita
dichotoma patentes ^{54 flori} flexuosi calycis incani floris dactylis
medio fissis

an argentea trifolia et trifolia hic descripta quando ad figuram
Rheedii nullo modo ad argenteam quadrat credo itaque eam
esse omnino diversam

negundo V. foliis quinatis ternatisque serratis, floribus racemosis paniculatis

Lin. S. V.

Müll. C. 275. fig. 1. 2.

Negundo arbor mas Bauh. hist. 1. p. 109.

Bomasi Rheed. Mal. 2. p. 15. t. 12.

Leyceum litoreum Rumph. amb. 4. p. 50. t. 14.

Habitat in India

folia pubes secundum Osbeck. et Rumph. pubes tomentosa an modo
varietas p. V. pleste

utroque nudis

non vid.

45 pube boni Vibex ^{Vibex} foliis ternatis utrinque pubescentibus, paniculas trichotomas
bracteis longitudine calycis
P. Jacq. Vibex lin. fl. reyl. pag. 195; n. 415. fide herbarii Hermanni
Habitat in India Orientali, nuncum communicavit de La Mart. 5
Rami tetragoni, pubescentes.

Folia petiolata, opposita, ternata: foliola ^{subulnime} sespili, ^{gibbosa} bipolliciana, ovata
attenuata, supra secundum nervos pubescentia, venosa, pub. integerrima, supra glabrescens, subtus pubescentia

Panicula terminalis, subtomentosa, magna, trichotoma, demum
dichotoma. solium ternatum ^{utrinque} sub primis trichotomis.
Bractea ^{natis} opposita, sespili, oblonga, obtus, longitudine calycis minora

Flor 6-7 in ultimis
ramis paniculae, sespili
ter, alterni

Flor sespili, alterni, nullos in dichotomia
^{in ultimis ramis paniculae}

Calyx campanulatus, quinque dentatus, in anis

Corolla calyce duplo longior, extus tomentosa

Bacca magnitudinis pepersi nigri, trapperma

(Differetia S. Anoploata: foliis subtus non canescentibus, pedicellis
non dichotomis, sed floribus longitudinaliter sespilibus alternis,
Habitus paniculae quasi bracteis patentibus vel subflexis,
majoribus quam in reliquis speciebus hujus generis

244
256

Geromandiana P. foliis ^{terrestris} radicalibus lyrato-pinnatis, superioribus obovatis
medio ovatis, floralibus cordatis pedicello brevioribus.

Habitat in Comandul

Caulis erectus superne ramis alterove florifero
pubescens teris striatus. Folia ^{villota} laciosa ^{terminali}
plurimum radicalium et inferiorum lanceolata. folia
intermedia petiolata, superiora sessilia. Bractea
parva cordata subintegerrima. Per Bracteam elonga
tus pedicelli pubescentes unguiculares. Dolesta
calycina lineari-oblonga villosa. Capsula
parva brevior. Capsula pisogramum major

ab altitudo differt bractei calycibus
creta floribus pedicellatis, calycibusque

Gelfia

Leucoxylon Vitex

~~Digitata~~ foliis digitato quinatis. folioli lanceolato elliptici ^{glabris} ~~impuncta~~
tis nitidi, paniculis dichotomis

Habitat in India ^{orientali} ~~occidentali~~ &

Rami superne ~~vellosi~~ pubescentes. Solia petiolata opposita.

Solia petiolata, ^{bi-} tripolliciana lateralibus minoribus ^{utrinque}
cava, ^{forma} ~~venosa~~ ^{opacis venosa} integerrima, supra nitida, ^{glabris}

ma. Pedunculi et alii ultimi ^{folio breviter} oppositi. Ses vel quater

^{infera} ^{superiora} ^{maxima} ~~lacinia~~ ^{dichotomi}. Calyx ^{dentatus} pubescens. Corolla parva limbo

Vitex Leucoxylon foliis digitato quinatis, folioli petiolatis oblongi
integerrimis, paniculis dichotomis, bacis monoplerma ^{Leucopyll.}

nos 293

~~an huius generis~~

Tomana B.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

divaricata Vitex

Vitex

foliis ternatis integerrimis glabris: terminali maximo, pani-
culo dichotomo divaricatis

Vitex divaricata foliis ternatis integerrimis utraque glabris,
paniculis dichotomis Sw. prod. r.

Frequens in Insula Martinique et St. Crois, Gallis bois de Grand
de von Rott

Rami cortice cinereo, obscure tetragoni, glabri

Folia ad apices ramorum, opposita, petiolata, ternata: foliola
petiolata membranacea, oblonga: lata utraque glabra; la-
teralia ^{oblonga} minora vix pollicaria, acuta, interdum acumina-
ta; terminale quadri- vel quinque pollicare, ovatum, acu-
minatum

Pedunculi axillares, solitarii, ter vel quater dichotome divisi:
pedicellus dichotomis unifloris, filiformis, uti reliqui

Pluken tab. 210-f. 34.

~~vellosum~~ ~~fruticosum~~ foliis ternatis ramis spinosis calycibus leguminibusque his
vellosum ^{fruticosum} ~~fruticosum~~ foliis ternatis, ramis spinosis, calycibus leguminibusque
vellosum Pour. d. T. 2. p. 240

Cytisus spinosus fliqua villosa Etneana Tournef

Legi in Babana et Neapoli

neque forte nil nisi varietas sp. spinosi cum non nisi calycibus
et leguminibus repetito lanatis in reliquis vero omnino conveni-
nit

altissima V. foliis ternatis integerrimis, paniculis verticillatis, Calca Triperna
Lin Suppl. p. 294 * L.V. p. 570.

Habitat in vasis Sylvis Deylona 5

Rami supremi tetragoni glabri. Folia pedicula ad apicem ramorum
congesta. foliola ternata sessilia utrinque attenuata, elliptica
senosa integerrima utrinque glabra tripolliciana lateralibus
memorata, panicula fructu bifido in racemo composito tractato
terminali. flores in fructu conferti carentes parvis bracteis
lineari

Lin fl. Leyd. no. 414. herb. Royen.

aliam huc simillam nam hinc quod folia quinata vel ternata subtus
vellosa uti panicula

nam mea hanc panicula non nisi in unico loco verticillata omnes
fere opposita vel alterna cum Mail Elem. bot. Mol. B. tab. 1
hanc sat convenit sed folia apice non serrata.

umbrosa Vitis foliis quinatis integerrimis, utraque glabris, racemis compositis
axillaribus Sw-prodr. pag. 93.

Habitat in Jamaica

Arbor tamis superne tetragonis. Folia petiolata opposita.
Soliola petiolata canaliculata elliptica palmata venosa.
Peduncululi axillares longitudine foliorum. Pedicellis
oppositis subtis floribus

Incisa Vitis folus 5natis crenatis. Spici linearibus terminalibus
Lour - fl. Cochinch. pag 391.

Habitat in China et Cochinchina &

Terrest. pedalis. folia raro ternata lanicolata rete venarum
tomentosa, rugosa opposita flori albo violaceo. Spici longa
involucello parvulo subulata. Corolla tubis hemisphaerica. Capsula
obtusis, 4 superioribus subaequalibus. Stigma 2 fidum. Bacca
Piper meum & perma.

Les Felis

Diante Tazpi

Annata V. foliis digitatis pinnatis, verticillis pedunculatis corymbosis caulis
adpresis. Medic. in Act. Pal. 4. phys. pag. 202. Tab. 8

annata Agri coffi