

Weigelia

l. japonica W.

japonica Weigelia Thunb. in Act. Holm. 1700. p. 137. t. 5. fl. Jap. pag 9 ob. 16. x
nov. gen. pag. 5.

L. V. p. 190

Vicini Utzugi Romph. Am. exot. fasc. 5. p. 855.

Habitat in Japonia &

Rami oppositi, teretes, cinerei glabri. Folii opposita, petiolata ovata
acuminata, serrata, venosa glabra, venis utrinque hertis, subtus
pallida, patentia, bipollicaria. Petioli valde herti. Peduncululi
in ramis et axillis foliorum. Pedunculatus solitarius & paucula
ala, compressi, dilatati, triflori, unguiculati, triflori, peduncul
li uniflori pedunculo Congiati. Bractea in apice peduncululi
et infra medium pedunculorum bina, erecta. Corolla purpurea

japonica W. foliis sesquialteris ovatis - Cuneolatis, Thunb. in Act. Soc. Linn. p. 2 pag

coroense W. foliis petiolatis obovatis Thunb in Act. Soc. Lin. p. 2. perz.
Habitat

repens Scheffeldia Lin Suppl. p. 135 * L. V. p.

Scheffeldia repens Forst. gen. n. 9.

Habitat in nova Zelandia

Parvula procumbens et repens, Rep. lid. Potula ad eo similis, ut de mta. fructificatio
ne eandem credo esse Lin l. c.

Sandw. species

~~_____~~