

Weinmannia

1. pennata W. foliis pennatis: folioli oblongis crenatis glaberrimis
2. hirta W. foliis pennatis: folioli ovatis serratis crenatis, subtus racemisque
hirsutis
3. tomentosa W. foliis pennatis: folioli ovatis integerrimis subtus tomentosi
fructibus caducis
4. trifoliolata W. foliis ternatis: folioli lanceolatis serratis glaberrimis, paniculis
compositis
5. parviflora W. foliis simplicibus ellipticis serratis subsessilibus, racemis
terminalibus ternis quaternisve
6. racemosa W. foliis simplicibus ovatis serratis petiolatis, racemis axil-
laribus.

glabra Weinmannia foliis pinnatis: foliolis obovatis crenatis glabris Lin. l. v.
nuz. 375. *

In montserrat legit de Puyant

Rami oppositi, superne alternatim compressi, villosi, cortice fusco
Folia opposita, pinnata cum impari trijuga: foliola interna

minora.

Petiololum articuli cuneati.

Racemi terminales, saepe gemini, quadripollicares.

Simplex Weinmannia.

Habitat in Madagascar Commeson Herb Mus.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, pollicaria, opposita, subtuncata, basi
acuta, apice emarginata, remote obtuse serrata, coriacea, glaberrima,
supra nitida arena, subtus obscure simpliciter venosa. Racemi ex axillis
supremis, solitarii, terminaliter plures, erecti, pedunculati, bipollicares.

3 Tomentosa Weinmannia foliis pinnatis: foliolis ovatis integerrimis subtus tomentosis,
filiis caducis Lin. Suppl. p. 227* L.V. p. 376.

Habitat in ~~Obfecto~~ nova Granata

Arbor cortice fuscente, valde ramosa, foliosaque: folia opposita pinnata
cum impari. Petiolo communis alatus, articulis obovatis. Foliola 11-13.
parva, crassiuscula, subtus valde tomentosa, ovata integerrima regularia.
Stipula foliaria utrinque, foliolis majoribus deciduis Racemi versus apicem
densissimi, quasi picea: pedicellis brevissimis. Nectarium Campanulatum
flammea cingent, integerrimum membranaceum Lin. l. c.

2 *Wendmannia foliis pennatis: foliolis ovatis serratis - crenatis, subtus ra-*
temisque hirsutis Schuy. prod. p. 63.

Wendmannia Brown. Jam. 212.

Habitat in Guayana
et a pennata diversa nisi hirsutis

Wendmannia

4 *Trifoliata* Weinmannia foliis ternatis. foliolis lanceolatis serratis glaberrimis, paniculis
compressis Lin. Suppl. p. 227. + S. V. p. 376

Habitat in Cap. b. p. p. t.

Glaber totus Rami inferne cortice purpureo superne virides, ^{compressis} oppositi. Solia
opposita, petiolata, petiolo communi unguiculati. Soliola sessilia ^{opposita} dentata
sulcata ^{remotiuscula} ferrata ^{puberula} ^{subimbricata} ^{bus in vertice inflexa} ^{sinu}
viri- ^{am} ^{pl} ^{pedunculata} ^{et} ^{resicillata} ^{compressis} ^{opposita}
dica. Pedunculi ^{opposita}, axillares, longitudine foliorum. Flores pubescentes
racimi ^{stili} ^{et} ^{compressi}. Capsula ^{inano}, ovata, biloculari

1 glabra Weinmannia foliis pennatis: foliis oblongis crenatis levibus Lin. Suppl. pag
220. S.V. pag. 325.

Weinmannia fruticosa, foliis subrotundis serratis, per pennas cordato-alatas,
racemi teroni nalisibus, pennis et ramis oppositis. Brown. fam. 212.

Weinmannia pennata Lin. Spec. pl. p. 515.

Habitat in ^{ant. St. Cruz} Tamara et Insula Bobonia 5

^{some palmaria}
Caulis ferele ramis oppositi; ultimis pubescentibus. Folia opposita
pedicelata pennata cum impari: costulo communi alato, articulis ob
soliole 7. 17. ^{altero lat. articuli angustior} nuda glaberrima, ^{long. acuta} folia, ^{long. acuta} sessile pollicaria, interiora
minor, crenis saepe utraque. ^{long. acuta} Petiolo oblongo, deciduo semineunguiculari
inter paria petiolorum solitaria. Racemi terminalis solitarii vel gemini, pedun
culati, erecti, foliis longioribus simplicibus. Flores numerosi, albi, magnitudine
Travella. Pedicelli uniflori, e singulis punctis pedunculis pluribus patentibus
sunt. Calyx foliis oblongis, patentibus albi. Petala calyce triplo longiora. Ra
mini capellana corolla duplo longiora. Germen ovatum bifidum. Styli feli
formes Stigmata capes capitata.

^{foliis major}
cum foliis oblonga, fructusque gemini in Comnes: adfuit an ex parte diversa ab occidentali
articuli inter folia non transverberana sed oblonga utraque utra

Racemosa Weinmannia foliis simplicibus ^{ovatis} ellipticis serratis ^{petiolatis} utraque glaberrimis. ^{ramis axillaribus} Lin. Suppl.
p. 227. LV. p. 376. Forst. prodr. pag. 29

Habitat in nova Zelandia.

Folia majora quam in reliquis

Weinmannia racemosa. foliis simplicibus ovatis serratis utraque glaber
rimis stipulis nullis Lin. Suppl. pag. 227. LV. p. 376

Habitat in nova Zelandia.

Folia majora quam in reliquis

Rami teretes glabri e capsulis tuberculatis. Folia petiolata
opposita glaberrima utraque acuta serratis obtusis
sequipollicinaria avenia obtuse nervosa supra nitida.
racemi folio longioris