~~Pellissera~~ Westia

Calyx diphyllus. Corolla monopetala subregularis. Legumen compressum

parviflora? ~~Peltifera~~ Nestra enneandra, foliolis oblongis nitidis avenis.

Habitat ad Serram Leonam L'Heritier

Caulis arboreus. Rami teretes, crassitie pennae anserinae, cortice purpurascente, glabri. Folia alterna, petiolata, pinnata cum impari, bijuga: foliola + opposita, brevissime petiolata, bipollicaria, integerrima, obtusa, firma, glaberrima, supra nitida. Panicula terminalis, racemosa, erecta. Pedunculus communis, et partialis, sulcatus, angulatus, post casum pedicellorum dentatus cicatricati ~~et pedicelli~~, tomentoso-incani. Flores alterni, breve pedicellati. Bractea oblonga, tomentosa, acuta ad basin pedicellorum, duae oppositae minores parum infra calycem.

ſquamoſa Tuſtica acaulis foliis obl ovalibus integerrimis utrinque laevibus
Habitat in america ſeptentrionali ♃
ſimilis praecedenti niſi quod vena ſubtus glaberrima et margo absque crenis

an eadem ac imbricata

grandiflor. ~~crispata~~ 1 Westia ~~Peltifera~~ decandra, foliolis oblongis venosis

grandiflora

~~Habitat in Guinea Isert~~ ♄

Arbor. Rami teretes, glabri, cortice fusco. Folia petiolata, alterna, impari pinnata, bi-s. trijuga: foliola petiolata, opposita, 3-4 pollicaria, interiora minora, oblonga, obtusa, tenuissime venosa‡. Pedunculi ~~terminales, plures~~ axillares, bipollicares: ut communes teretes, articulati, incani; ~~Flores racemosi~~, pedicelli alterni, uniflori. † Calyx tomentosus, ante explicationem clavatus, diphyllus, pollicaris. Petala inferne in tubo coalita, tomentoso angulato: laminae spathulatae, sesquipollicares, extus villosae. Stamina 10, corollae tubo inserta. Germen hirsutum. Legumen pedicellatum, tomentosum, pedicello recto, horizontale, lineare, 4 pollicare, pollicem latum, compressum, margine incrassatum, obtusum, mucronatum.

‡ Panicula terminalis racemosa.

† Bractea ovata subconcava ~~extus~~ incana, intus villosa.

Peltifera arborea Isert ~~figura leguminis~~