

Wildenovia

Calyx multiglumis. Corolla hexapetala. Tripla uniloculari

1. Congrua W. Culmo basi, ramis compressis
2. teres W. Culmo ramisque teretibus lumbis
3. striata W. Culmo terete striato

Waldenovia Thunb. Act. Holm. 1790. p. 28.

Calyx multiglumis. Corolla hexapetala. Ompa uniloculari

Elegia

Calyx sexglumis inaequalis. Corolla 0. Capsula uniloculari

Restio

Calyx sexglumis compressus, glumis navicularibus. Corolla nulla. Triclini trochilus

glandulosa Willdenowia Cav. ii: pag. 61. Tab. 89. x
Habitat in Mexico

1 compressa W. culmo laevi, ramis compressis Thunb. l. C. Tab. 2

Habitat ~~cum~~ ⁱⁿ ~~procedente~~ Cap. 6 p. 1

Culmus 2-3. scithomus, laevi, glaber bipedalis. Rami compressi vel tenuiter
royat. Vagina ramificationum ovata acuminata. Folia in ramuli
ramis simulata, filiformi setata. Flori terminales plerumque
dorsi magnitudine p. 1. glumae calycinae umbonatae, acuminatae an
flatae, glabra margine membranacea. Stigmata 3, plumosa. Drupe
compressa ancepi, obtusa, cinerea

in mea Flore magnitudine Congl

2 Versi Wilden. culmo ramisque vertibus lobis id loc. cit. Tab. 2.

^{Habitat in campis}
Culmus ramosissimus articuletus, dichotomus et trichotomus, glaber erectus
pedalis vel ultra. Rami saepe tripartiti. Vagina ramificationum et ramorum
ovata, glabra, fusca, unguiculis utraque. Flores terminales solitarii, erecti. Involucrum
glume calycino unguiculis, ovato, aristato, glabro, fusco. Petala emarginata
a. Stigmata duo plumosa. Intra atra, lobi thur.

numeri

2 striata W. Culmo tereti striato Thurb. l. c. p. 29 Tab. 2.

Habitat in arenosis C. b. sp.

Culmus ramosus, raro trichotomus saepe dichotomus, tereti, articulatus, glaber, erectus
bipedalis et ultra. Rami tereti striati

Vagina articulorum et ramificationum ovata, glabra, fusca. Solia nulla

Floris termini nullo solitarii erecti, densi, magnitudine pisi. Glumae calyptrae
circiter 10. 12. aequales, glabrae, margine membranacea. Intra nigra, puncta
ta. Styli interdum duo

non vidi