

Wintersia

1. granatensis W. pedunculis axillaribus elongatis trifidis, pistillis octo
2. aromatica W. pedunculis aggregatis terminalibus [†] pistillis quatuor
3. axillaris W. pedunculis ternis axillaribus, pistillo uno

[†] fructus elongatus

2 Aromatica ^W pedunculis aggregatis Terminalibus peltatis quatuor
Linn. Suppl. p. 269 & S. V. p. 507.

Prinyi Winteri Linn. & Forsteri nov. act. Lypf. 3. p. 101. ~~et~~
Winterana aromatica Soland. in med. Obs. and Traqui v. 5. p.

46. 7. 1.

Peniclymenum rectum foliis launni, cortice aromatica acni
Act. angl. an. 1693. n. 204. p. 922. t. 1.

Habitat in America australi vallibus foliis oppositis

Rami cicatrici glabri. Folia ⁱⁿ ramulosis approximata
breve petiolata coracis ^{naledion} ovata ^{naledion} enervia, glaberrima
super nitida, subtus ~~naledion~~ a margine panem ^{naledion} ^{naledion}
fata. Pedunculi folios breviori. Tandem elongati bifidi
demum axillares. baccis quatuor in receptaculo
punctato fissili obovato glabris

Forster in Bonner J. 1709. p. 34 tab. 7.

Prinyi axillaris ^{naledion} in Syst.

3 axillaris W. pedunculis ternis axillariis per illo unico. Lin
^{suppl. p. 270}
Spreng. axillaris. Desf. n. gen. n. 42. Hoffm. Act. upf.
v. 3. p. 107.

Habitat in nova Zelando nemoribus: 5

Trami teretes fusci, folia petiolata, alberrima, con-
sistentia minori quam in reliquis subtus glaucis
arenis supra glabri puberuli lanicolato ellipti-
ca obtusa. ^{capitula} Pedunculi vix unguiculati

1 granadensis W. pedunculis axillaribus elongatis trifidis, pistillis octo

f. v. no. 507

Dignus granadensis L. Suppl. pag 269 *

Habitat in Nova Granada &

folia oblata subter glauca ut fere albida longosa.

Pedunculi axillares solitarii bini s. terni, filiformes
elongati, folio brevior supra medium trifidi. Pedicelli
uniflori

non vidi