

Witjenia

95. Witjenia Cor. 1-pedala, 6-partita. Stigma bifid 3-fidum. Cap. 8-supero

1
Eggs of Crocus

maura 1. Witzenia caule subsimplici, floribus spicatis ex tuis tomentos
Artholiza maura; corollis regularibus ex tuis tomentos Lin. Maud.

175.

~~9.~~

Witzenia maura Thunb. nov. gen. 2. p. 34. cum icon. Lamour. illu
str. 1. p. 108. t. 30

5000

Habitat ad latera montium Cap. b. spei & basi frutic.
Caulis bipedalis, simplex, interdum superne ramo acutus. Sola
approximata, sub spithama, superiora caule altiora, basi in
tus ferruginea. Spica terminalis, composita e spiculis alternis,
in tria alis. Spithula subtiflora. Corolla in fundi tubiformis, tubo
superne atro. Limbus intus luteus.

Comosa # paniculis comosis, pedunculis multifidis capillaribus, foliis
ovatis acuminatis integris Sw. prodr. 17. Fl. ind. eur. d. 1. p. 77

Habitat in Hispaniola. §

Bracteae
lobae glabrae
lobae venosae
lobae petiolae
oppositae

Caulis arborescens altissime scandens: Ramis multiverticillatis
divariatis reflectis pendulis lobibus. Folia venosa utraque
glabra. Panicula ramis ^{ramulis} multifidis ^{erectis} ad apicem
terminatis pedunculis capillaribus
copiosis sessilibus unifloris albidis. Flores multiseriati
polygami pauciflori fructiferi. Petala oblonga obtusa
apice reflexa alba persistentia. Nectarum gemmae unguis
uliquis adnatum depressum integrum carnosum filamentum
oppressum interiori nectarii inserta. Styli rotundum capsula
longitudinaliter dehiscens. Nucis quatuor oblongae angulatae
+ in ^{polvis} mollescunt. Pericarpium induratum apice et lateribus al-

20

ramosa. $\frac{2}{3}$ Witsenia Caule ^{fruticoso} ramoso, floribus terminalibus subsolitariis glabris.

Fraxia fruticosa; caule fruticoso ramoso. Lin. suppl. 93.

Fraxia fruticosa; caule ramoso, foliis imbricatis tacto. Thunb. Diss. 2

Fraxia. n. l. t. l.

Fraxia fruticosa; caule fruticoso ramoso, foliis linearibus disticte imbricatis Lamarck. illustr. 1. p. 108. t. 31. f. 4.

Habitat in Cap. b. 3 p. 5

Caulis semipedalis, ~~fruticosa~~ ramosus: rami sparsi, inferius inferne partem
caesum foliis oblique annulato diadematibus et alternatim denticulatis
foliis pollicariis, in versus apices ramorum, pollicaria, sursum minus
caesum, ferrugineo. Flores solitarii vel gemini, in ~~spathis~~ ^{spathis} membrana
Corolla Tubus semipollicaris, filiformis, flavus:
Limbus corollae.

Fraxia fruticosa

repens Enoi ^{hub} periculis ramosis ~~foliolosis~~ repentibus; scapis nudis, foliis
confertis ensiformibus ~~brevibus profertis~~ seu utris La Mart. T. Eni
pag. 213. Tab. 50 fig. 2
Habitat in insula Bobonis

non vid.

pumila B. Wibbenia caule simplici uniflora.

~~Galaxia obscura, foliis subulatis canaliculatis, tubo corollae brevi~~
Cavan. Diss. 6. p. 341. T. 189. f. 4.

~~Galaxia pumila; caule simplici unifloro, foliis subulatis compressis distichis~~
Eerst. in comment. gotting. p. 20. T. 2.

Tapcinia Fus. generis g.

~~Galaxia antholyzaefolia, foliis ensiformibus distichis, caule longioribus,~~
floribus racemosis

~~Galaxia magellanica. caulibus fasciculato caespitosis brevissimis subramosis,~~
foliis distichis intricatis, floribus solitariis subsessilibus. Lamour.
manth. illustr. 1. p. 109.

#

Galaxia obscura
Cavan. Diss. 6. p. 341. T. 189. f. 4.
planta est etiam
hujus generis

~~Monca magellanica; caule aenipiti folioso, foliis distichis foliis foliatis,~~
flora terminali solitaria W. & A. Spec. pl. 1. p. 241.

Habitat ad fretum magellanicum.

Caulis plures, caespitosi, interdum sesquipollicares. folia confertissima,
pollicina, flores parvi, subsessiles inter folia ultima spathaformia.

#

Habitus. Caulis aenipiti vagina foliorum tectus. folia equitantia, disticha
linearis ensiformia, acuta, striata, glabra.

Caroliniana Hynd

Habitat in Carolina herb. Pusp

Folia radicalia, linearis ensiformia, pollicaria vel parum ultra

habeo