

Wulfenia | Cal. quinque-partitus. Cor. ringens. Caps. ²⁻ bilobularis, quadri
2-valvis.

30 Wulfenia Cal. 5-partitus. Cor. ringens. Caps. 4-valvis, 2-lobi
Cano.

Buonarota, Wulfenia caule folioso, foliis subrotundo-ovatis, corollae labio superiore indiviso

Chamaedryos montis Sumani Bauh. hist. 3. p. 209.

Buonarota montana Italica, Chamaedryos folio, flore coerulea Mich. gen. 19. n. 1. t. 15. f. 1.

Paderota Buonarota, foliis serratis Lin. Spec. pl. 20. Faicu. fl. Austr. 5. app. t. 39.

Paderota coerulea; corollae labio superiore indiviso Lin. Suppl.

84.

rotundifolia β . Buonarota montana Italica Chamaedryos folio rotundiore et quasi ciliolato, spica coerulea habitore Mich. gen. 19. n. 2. t. 15. f. 2.

Habitat in alpidibus Austria, Carniolia, Italia &

Daciae Verona. Caulis simpliis, ramosus, erectus, palmatis, teretibus, supra villosus, subaerescens. Folia omnia opposita, subpetiolata, plerumque quinque parium in caule, pollicaria, suprema et infima minora, subrotundo-ovata vel oblonga, obtusa interdum acuta, a medio fere ad apicem serrata, glabra vel pilis rarioribus adspersa. Racemus terminalis, pollicaris. Calyces pilosiusculi.

~~Pedunculati infrastylarici, pro hinc aeres et
 flamma ultra floris hinc fusco purpurea
 usque hinc de subangulati. Pedicelli
 oppositi et per murales inferum Ni
 ni inferum oppositi. Quam parvis 2-3
 flori flori pedunculati bracteae operata
 sub spatulata mucronata
 flori linearibus in aridam desinentibus
 Calyx tubus brevis tetragonus angulo acutus
 lobis brevis subglobosis lacinae quatuor lobis an
 te infra apicem aristata
 Petala quatuor oblonga sublonga sessile
 calycis triplo longiora
 Stamina filamentis longioribus compta
 stylis longioribus filamentis stigma obtusis~~

Quercus

Calyx si qua pediculis laciniis oblongis obtusis
 dorso concavatis lobis cava obtusis
 Corolla monophyllata si qua pediculis laciniis oblongis
 obtusis
~~Petala
 basi inaequalia lanceolata lobis glabris lobis 2-3
 velosa lobis subinvalis laciniis breviora
 Stamina filamentis quibus staminibus lobata
 cuncta brevibus ~~receptaculis~~ ~~stylis~~ ~~staminibus~~
 styli
 Neclavium truncis pedunculatis~~

Ageria 2 Wulferia caule folioso, foliis ovato-lanceolatis, labio superiore emarginato +

Bonarota montana italica Chamodrys folio, minus crenato, spica lutea Mich. gen. 19. n. 3.

Poderota lutea; corollae galeae labio superiore bifido Scop. an. 2. p. 41. Lin. Suppl. 84.

Poderota Ageria; foliis serratis; inferioribus alternis. Lin. Mant. 171.

Poderota Bonarota Gaiqu. hort. 2. p. 55. t. 121.

Habitat in Carnioli, Italia

Caules plures, spithamoi et ultra, ~~simpliciter dimittuntur, villosis~~

inferiora sen ~~subi~~ folia breviter petiolata, ~~supposita~~, interdum alterna, usque inter
bin. minora, dum terna[#], argute serrata, leviter villosa. Racemus ~~terminalis~~

mutans, subpollicaris. Bractes lineares, calycis parum longiores. ~~Corolla~~
Corolla sulphurea Gaiqu. l. c.

Carinthiaca Wulfenia caule nudo, foliis crenatis. Smith in Act. 901. Lin. 6. p. 96.

Wulfenia Carinthiaca Jacq. miscell. 2. p. 62. t. 8. f. 1. Fr. var. 1. t. 2.

Reyn. et Hohenw. itin. bot. 1. p. 73. t. 1.

Podetota Wulfenia foliis radicalibus oblongis obtusis, spica secun-
da, caule nudo. La Mark. illustr. 1. p. 48. t. 13. f. 2.

Habitat in summis alpebus Carinthiae solo pinguisimo &
Folia radicalia, obovato-oblonga, grosse crenata, crenis sub-
mulronatis, glabra, excepto costa subtus, simpliciter venosa. Sta-
pus erectus, spithamens, foliis altior, teris pilosis scabris, squama lan-
ceolata una alterave superne vestitus. Flores pedunculati pedicellati,
secundi apr. Bractea ad basin pedicellorum, lanceolata. Corolla
fovea barbata: Calicium superius integrum.

Habitus. Caulis vel scapus simplicissimus, ~~foliis~~ ^{erectis teretes, villosi}
Racemus Terminalis.

Wulfenia

Cal. 5que ~~partitis~~. Cor. ringens, labio superiore brevi integro; inferiore tripartito, faucibus barbata. Caps. biloculari, 4valvi.

~~1 canthidea W~~

Speciem P. docta facit La Mark ^{4es} et videtur juve