

Hanthium

Strumarium * caule nermi, foliis cordatis trinerviatis

El. Dan.

Hanthium Buchf. hist. 579.

• Lappa minor f. Hanthium Dioecoides Bauh. Pin 190.

Habitat in Europa ☉

Caulis erectus angulatus pilis raris adpressis. Folia
petiolata remota biquadripolliciana angulata
serrata, et punctis minutis. ^{dentibus glandula} ^{et pilis} ~~abruptula~~ ^{acule} ^{aristato} ^{villis}
adpressis. ⁱⁿ ^{nu} ^{ora} ^{tormentosa}. flores axillares sessiles

angulatus

orientale⁷ caule inermi, foliis lanceiformi - ovatis subbilobis Lin.
Dec: 33. tab. 17. Spec: pl. pag. 1400*

Stanthium majus Canadense Herm. Lugdb. 635.

Stanthium elatius majus americanum, fructu funulis aduncis
munito Monf. hist. 3. p. 604. f. 14. tab. 2. fig. 2.

Habitat in China, Japonia, Zeylona &

Caulis sulcato angulati superne pilis minutis raris adpressis
folia petiolata, remota, supra scaberrima & punctis minutis
cellosis albidis, subtus minus scabra, obtuse grosse serrata
serraturis glandula flavescente terminata

foliis subcordato ovatis triplicem ^{sub} trilobis

Echinatum ⁷⁴ caule nermi, fructu ovali aculeato, aculeis uncinatis
confertis basi echinatis Murr. in Comm. Gött 1784. T. V. pag. 852.

non vidi

americanum H folus cūpiscatis lobis serratis tri nerviis, paleis flores ma
ficulos squantibus, involucri infloris Walt. fl. carol. pag. 231
Habitat in Carolina

non vid.

Ceratoides
prostrata A foliis lanceolatis tomentosis, floribus foemineis lanatis
Gaigu. Misp. Aust. 2. p. 355. Gmel. Sib. 3. p. 17. t. 3. fig. 2.
Ceratoides orientalis *fruticosa*, Elsaagni foliis Tournef. corol. 52.
Habitat in Tataria, Moravia Oriente &

Junosum \times *spinis ternatis, foliis trilobis.*
1. p. 336

Jaeger. collect.

Hanthum lusitanicum junosum Pluk. alm. 206. tab. 239. fig. 1
Heron. Parap. 246. t. 246. Magn. hort. 200. tab. 200. Volth.
Nonb. 149. tab. 149.

Hanthum junosum, atiplicis folio Monf. hist. 3. p. 604.
fig. 15. tab. 2. fig. 3.

Habitat in ~~his~~ Europa australi \odot

Caulis angulatus ramosus pubescens rami alterni
Folia petiolata alterna bipollicaria subpinnatifida

laciniis lanceolatis, oppositis 2. vel 4 utroque axilla
indumenta ^{nili, capsulis albis} supra ~~glabra~~ nervo tomentoso pro singula lacinia
ramulorum ^{in axillis subtus} unica de nervo nervosa spinis ad latera
foliorum opposita triplicata laciniis patentissimis
teretibus pollicantibus glabris nitidis flavescens

laciniis integerrimis

foliis subpinnatifidis subtus incanis

fruticosum # foliis pennatifidis: laciniis incis, caule fruticoso herbisuppl.
pag. 410. P. V. pag 252 L'Heritier Sup. Nov. 2. Tab. 91.
Ambrosia adoresperis Mill. Dict.

Habitat in Panz

Caule viri lignosus angulatus subpellosi. Rami laterales
exares breves. Folia petiolata alterna remota, supra
vndia orculo armato pubescentia subtus tomentosa incana
laciniis lancicolata attenuata quinque dentato pinnati
fido subvenosa. floralia lancicolata serrata
Petioli ^{folio} ~~margini~~ decurrente angusto marginati. ^{racemus} ~~racemus~~
masculi terminalis palmaris flores sparsi nudantes
foemine ^{seorsim} ~~inferne~~ et axillares in pedunculo masculi
rum et axillis spicati

— subbipinnatifidis subtus incanis spicis masculi
terminalibus elongatis