

Himeria

1. americana H. foliis oblongis, pedunculis multifloris
2. mermis H. foliis ovatis, pedunculis unifloris

Ogypnaceae Horne mei

Aegialia alp. Egypt.

Lin. Spec. plant. Ed. 1.

Herb. ^{400 ft}, Rami Veretei, rami. Sola geminaria percole brevi, semipellucida, lanceolata, utrinque acuta, rufosus, officina venosa, ^{coeca} pupa supra axillaris, patens; canescens; fere semipellucens, in specimine e Senegal tripolliaro.

americana *Hemeria*

Rami Veretos, corice cavae, glabri, plerisque spinis alter
no foliato nigro unguiculatis. folia et flores in ramulis
brevibus in articulis presanum, foliata vel gemina inqualiter
lesque pollioano vel minoro oblonga obtusa emarginata
basi acuta glaberrima integrum venusimo venosa avearia
pedunculis utrū unguiculatis pedunculis foliatis vel gemina
longitudine petiolatis ~~quadrifloris~~ pedicelli umbellati
flores glabri

hespania Jobo

elliptica tumenca

Corporis
Habebat. herb maf.

Inermis. Ramis teretibus, glabri. Dolia in apice ramorum conferta, pollicata vel paucim
ultra, elliptica, obtusa, integerrima, obscure simpliciter venosa, glaberrima, Pe
dunculi ex apice ramulorum, pleves, unguiculares. Petolo parum longior.
Fadicelli ramosi, longitudine fere pedunculi. Flores glabri

americana Humera foliis oblongis pedunculis unifloris multiflora Lin Spec pl. pag
497. & S. V. p. 361. Gaegu. Amherst. t. 177. f. 31. Sw. obj. p. 149.
Humera aculeata, flore velloso fructu cutoe Plum. Gen. 6. t. 261. f. 1.

Habitat in America.

Folia ovato-oblonga, alterna, integerrima, petiolata. Spina ad singulam
folionum ax. Islam. Rademus multifloris; inter spiram et ramum. Lin.
stamina?

non vidi

uniflora *Hemerocallis* folio ovatis pedunculis unifloris Lin. C.V. p. 361.
Amygdaloborealis; folio ovatis glabris: reticulationibus confertis, petiolis pubinargi-
natis; floribus solitariis Brown. Jam. 209.
Habitat siccis Campestris.

non vidi