

Hylaphylla

Hylaphylla prolixa
Arbre dont le bois est très dur et peut passer pour l'Ébène grise
soa fait re & la court herb mus

^{Stromb. cu}
Califolia tylosphylla foliis pennatis: foliis lanceolatis, rhombis crenatis crenis

califolia floriferis, floribus sessilibus

Habitat in Jamaica

aeterna utronna attenuata basi acuta
vel tri

Rami teretes
folia petiolata
pithamaea

^{califolia}
similis procedenti folia saepe foliola bipollicaria a medio fere ad apicem
basi integerrima crenis approximatis flores plures sessiles ^{truncata}
et in axillis petiolorum ^{terpedas}

foliatis subulata in aera de basi ad latus folioli basi. Petiolis ^{hypocorvax} subpinnatis compressis
^{hypocorvax} *Stipula* versus apicem ramorum conferti ^{falcato} *Stipula* ^{falcato} lanceolata

subulata ^{summitate} *Stipula* ^{summitate} femineo deciduo in axillis petiolorum et ad
latus foliolorum

Hemionitis affinis americana epiphyllaenthor; folio simpliciter pennato,
Hypoglossis simile, radice septatae lignosa ad foliorum crenas florida

Plukh. phyt. 36. t. 7.

tylosphylla ^{califolia} foliis ^{lanceolatis} ^{lyctibus} ^{ramis tetragonis} ^{Len. Mant. 221.}

~~*tylosphylla* ^{califolia} ^{ramis tetragonis} ^{Len. Mant. 221.}~~

tylosphylla *califolia* foliis pennatis lato-lanceolatis crenatis; floribus
pedunculatis hermaphroditis hexandris, femineis que mox
Schw. prodr. p. 20.

Arbutifolia *Hypophylla* foliis pinnatis lanceolatis acuminatis pubescentibus cuneatis
floribus pedunculatis Schw. prodr. pag. 20

Habitat in Tamauc.

^{puthamia}
Folia pinnata cum impari novempuga. Foliole alberrime lineata
Requipedicaria brevissima, utraque acuta, oppositamate genata
tapi indegerrima. Pedunculi et crenis solitarii interdum gemini
unguicularis capillares. Stipulae ~~pubescentes~~ ^{pubescentes} bifidae in flagella
axilla foliorum. Petiolus terminatus globulo squaroso ~~pubescente~~ ^{pubescente}

Similis latifolia at folia breviora

angustifolia stylophylla foliis pennatis linearibus laciniatis lineatis crenatis
floribus pedunculatis Pch. prod. p. 20

B. foliis ~~angustis~~ ^{Phyllanthus} ~~obtusis~~ ^{2. Brown. p. 100.}
Habitat in Jamaica

Rami teretes glabri cinerei. Folia angustata ⁴⁻⁶ bipinnata ^{foliola} 5-6.
remota crenata, interdum pubescentia basi attenuata, remota
Petiolus aniceps. Flores hermaphroditi.

Falcata *Hypophylla foliis linearibus lanceolatis crenatis: crenis remotis floriferis* Hort.
New. 1. p. 376

Phyllanthus americana planta, flores e singulis foliorum crenis profertur.
Com. hort. 1. p. 199. t. 102. Sel. thes. 1. p. 21. t. 13. fig. 2. Catech. Car. 2. p. 26.
t. 26.

Pilea folia hemonitidis affinis americana epiphyllanthos angustior et longior
folio, ramosa caulescens Pluk. alm. 134. t. 247. fig. 4.

Phyllanthus epiphyllanthus foliis lanceolatis serratis: crenis floriferis

Lin. Spec. pl. pag. 1392.

*Hypophylla falcata foliis parvis linearibus lanceolatis subfalcatis
crenatis, floribus sessilibus trinerviis monochis* Schw. prodr. pag.

²⁰
Habitat in Bahama

Ram. terete crenatis. Folia parva, basi attenuata 3-4 pollicia
na, saepe falcata ^{frequentia} subtruncata, lineata glaberrima. Stipula
ovato acuta adpressa persistentes. Flores minuti pedicellati 6 octo
in singula crena: Crenis alternis. Capsula magnitudine feminis
conarum

ramiflora *Stylophylla* foliis ellipticis, floribus axillaribus Hort. Kew t. p. 376.

Pharnaceum suffruticosum Pall. d. 3. p. 71 b. t. E. fig. 2.

Habitat in Siberia

Rami teretes purpurascens alterni juniores filiformes subternati rudes
Folia ^{atropurpurea} petiolata glabra, unguiculata margine paucum revoluta subim-
bricata venosa utraque acuta. Pedunculi axillares solitarii uno flori-
capellares nutantes, apice inaequali. Capsula magnitudine seminis Conan-
di.

montana. *Hyllophylla*. Folii distichis lato lanceolatis inciso serratis; ramis apice
anicipitibus; floribus sessilibus. Lhu. prodr. pag. 20.
Habitat in Jamaica. 7

Hypophylla ovata Bankf.