

~~110~~ 111

Xyris

Xyris: Cor. 3 petala, ovatis. Pet. 3. ~~Capit. globosa~~ Glumae  
3 valves cartilagineae in capitulum. Capit. superu,  
i. locularis

Xyris indica altera Symb. bot. 3. p. 7

+ glaberrima striata

brevis folia dedit Richard

+ ferruginea margine <sup>bis. vaginante</sup> <sub>lat. conbus</sub>

<sup>crebris</sup>  
scapus simplicissimus glaber, folia ensiformia  
glabra, capitula terminalia umbellata Equisetum

indica 1. Ayris slapo sulcato multangulo, capitulo ovato.

Planmota Herm. deyl. 41.

Kotsjilet ti-pulle Rheed. mal. g. p. 139. t. 76.

Gladiosi lacustris arabensis malabarica et capitulo botryideo  
florifero Plukh. alm. 170. t. 416. f. 4.

Ayris indica Lin. pl. Rayl. p. 14.

Habitat in India orientali et

folia interdum pedalia vel longitudine slapio, lana, acuta, stria  
ta, unquam fere lata. Sicpi plures, penna columbina pauc

tenues, sex vel octo pulvati, inferne folii. Capitulum acuta  
Consp. pauc minor: 8 quamo subrotundo. Anthera linearis, emar  
ginata, corpuseulum penicilli forma ad basin singula, ut jam  
vidum observabit Rheed. t. c.

Folia unquam tam lata vidi, ut habet figura Rheedii

macrocephala 2 Hypni Stagio uniangulato, capitulo squamisque ovatis

<sup>Dorsis cinereis</sup>

Habitat in Cajenna. Ex herbario Desfontainii

Folia sesquipedalia, unquem fere lata, ~~et~~ <sup>et ultra</sup> Statio foliis  
altioribus, inferne veretes, superne subancipites, altero latere con-  
vexi capuli, altero acuti. Capitulum fructiferum nucis Congli  
duplo major, ovatum. Squamae obtusae.

Differt a reliquis magnitudine latitudine foliorum, magni-  
tudine capituli. Hypn. ancipitis varietas  $\beta$ . Lamantia huc  
pertinet, ni fallor, differt solummodo minor capitulis minimè pa-  
rum minoribus, atque floriferis, neq fructiferis.

Pulcato Hyoni

1) Urtica Hyoni Scapo ~~triangulo~~ angulato, foliis vaginantibus flexilibus, squamis obtusis  
# Hyoni indica Lam. ~~Lat. pag.~~ fl. Zeyl. p. 14. fide herbarii Hermannii

Scapi pedales plures. ~~interdum~~

# Urtica Hyoni indica Lam.  
ti-pullu.

Rheed. Mal.  
9. pag. 139.  
tab. 71.

folia scapum inferne vaginantia longitudine fere scapi vel parum breviora, inferne scapum vaginantia  
Filamenta tria. Anthera lineares, ~~emarginata~~ emarginata, corpusculum penicilli formi utriusque ad basin funiculi antherae, uti jam dudum observat Rheed. Hort. malabarico. c.

folia nunquam tam lata vidi ut habet figura Rheedii.

gladiolo cuiusvis acies malebanica e capitulo botryon  
deo florifera Pluken alm. 170. t. 416. fig 4

anceps  
pauciflora 3

anceps, leri

Hynis Scapo tetragono, capitulum ovato subgloboso.

Hynis india a cetera Symb. bot. 3. p. 7.

Hynis pauciflora; foliis lineari pubulatis, vaginantibus, capitulo obliquo, squamis ovatis obtusis Wied. Hist. 1. p. 2. n. 7. t. 11. f. 1.

# Habitat in Malabar 4

Solia rigidiuscula, Scapo triplo vel quadruplo breviora angusta  
Dus vel tres inferne in scapo oppositi

# Hynis anceps;

Culmo compresso

biangulari, capi

tulo subgloboso

La Mart. illustr.

1. p. 132. f.

Scapi plures, <sup>pediculis</sup> spithamea infra, terti, leres, minime striati.

Capitulum, sive magnitudine pisii: squama subrotunda, parum emarginata, convexa. Calyx squama tres, duae exteriores, na si ciliares, inferne attenuatae; tertia subrotunda, marginibus latis,

senis: onibus, florem nondum evolutum dorso, ob ut extenon bus inclusa, compressiuscula, brevior. Corolla tripetala:

unghes hyalino, longitudine calycis: laminae obovato, luteo patentes, denticulatae. Anthera in faucibus corollae, anice tri-

dentata, basi stipitata corpusculis binis penicilliformibus longitudine antherarum, ope lenticis hyalinis. Stylus profunde qua tripidus: laciniis superne dilatatis, compressis, apice verte

culo armato margine denticulatis

Americana 4. *Hynis* scapo superne ancipiti, capitulo ovato-oblongo

Juricai P. bras. 230. fide herb. Martiana

*Hynis americana*; flora coeulata, foliis 8-10-neris Aubl. fl. Guian. 40. t. 14. Capitulum, minima vero folia.

*Hynis juricai*; foliis gramineis linearibus lateribus subparallelis obtusulis, scapo ad apicem dilatato squamis rotundato-obtusis Aut. bot. h. n. par. 1. p. 106.

Habitat Cayenne 2

Folia scapo dimidio vel duplo breviora, grassinea, angusta, acuta  
capiti pediculis utraque, inferne tres, et a lineis duabus decurrentibus  
subtriangulatis, superne compressis, sub capitulo planis dilatatis

Capitulum obtusum, pitho porum major: squama oblonga, concava,  
apice emarginata, cum mucrone subcalloso fusciscente in emar-  
ginatura, nitida.

vide

Folia in Hydris americana Aubl<sup>e</sup>ti ad speciem Eriocauli pertinent  
capitulum vero huius per Hyridi, et pessime depictum tam quoad  
equam capituli, tam quoad flores.



caroliniana 5. Xyris Stapo ancipiti, capitulo ovato acuto

Xyris caroliniana; culmo compresso, capitulo oblongo subacu-  
to Lamarckii illustr. 1. p. 132.

Xyris caroliniana; foliis gladiatis, scapo longo, floribus  
luteis, filamentis latis. Stylotriphido patulo, longitudine  
staminum. Stigmatibus capitatis Walt. fl. car. 69.

Xyris juncifolia. Michauxii fl. bor. amer. 1. p. 23.

Habitat in Carolina. Specimina meum communicant  
Lamarckii, Richard et Bosc 4.

Differre michi videtur a X. americana. foliis rigidioribus,  
capitulis majoribus, acutis nei obtusis bimis. floribus luteis  
minime vero coeruleis. Specimen Lamarckii gaudet capitu-  
lis longioribus qu oblongis, longioribus quam Richardii,  
Boscii foliis lum basis fusco- mignicant. Variet foliis lon-  
gioribus et brevioribus.

Capensis C. Hylio capitulo ovato, foliis linearibus brevissimis Thunb. prodr. p. cap-

12. +

Habitat in Cap. b. spec.

~~profructibus Chamissoi foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis  
nervi, nervis articulisque peltatis  
Habitat in insula St. Helena Doctor Carolus de S. Robinson 5  
Rami demum, pappi non demum, in comam  
et alio profructibus aeternis lanceolatis, vix profructibus  
pappi munita, fuge glabra sublongo, subtus demum non  
vix dectis, mucronatis, integerrimis.  
Pappi: brevissimi, demum decti.  
Rami articulis, peltatis, vix demum, articulis lanceolatis, vix demum.  
Rami muniti, pappi non demum, in comam  
et alio profructibus aeternis lanceolatis, vix profructibus  
pappi munita, fuge glabra sublongo, subtus demum non  
vix dectis, mucronatis, integerrimis.~~

zeylanica Olax Lin. fl. zeyl. 39 \* Olax

Rami e lineis decurrentibus flexuosis angulatis, glabri, cortice rinde  
flavae siccanti, colore fer<sup>ut</sup> visco albo, transversim tenuissime rugo  
fo.

Folia petiolata, alterna, bi s. tripolliciana, ovata lancicolata

glaberrima, tenuissime nervosa, vix venosa, obtusa, integerrima  
axillari, simplicissimi, folio brevioris, plerumque solitarii  
in medico. rarius gemini. Pedunculi filiformes, post casum florum

denticulati

abbor stercoaria Zeylanica glandifera Burm zeyl 26  
an mutuo

Calyx marginis brevis integer. Petala tria sub latiora bifida

ad Nectarium lineare bifidum petalis insertum ejusque  
longitudinis Stamina 3 uvella breviora

Rami alterni

folia pet. alterna, glaberrima integerrima obtusa  
vicini axilla ped. filiformes post casum pedicellorum denticulati

tetra 8 petales

foliis ovatis acutis ramis angulatis

7  
brevifolia 7 Hyris Scapo tereti, capitulo globoso

Hyris brevifolia, foliis subtriangulatis, fere subulato-glabriatis;  
Scapo gracili, teretiusculo, subequali: capitulo parvo, globoso. Mi-  
chaux fl. bor. Am. l. p. 23.

Habitat in pratensibus adis Georgiae inferioris. Boiss.

Folia sesqui pollicaria, angusta. Scapus spithameus, filiformis.  
Capitulum magnitudine Pip. nigri. Squama lato-oblonga, exte-  
riores angustiores, carinatae.

*Luspania Coeflegii* Rota Holm. 1759. p. 16. t. 1. fig. 1. Loef. 8. 113. t. 1. fig. 2. 7

Spec. pl. pag. 50 +

Habitat in Hispania collebus apertis ☉

Caules plerumque diffusi digitales vel ultra quibus viscosi tenuissimis  
pubescentes. folia ad articulos opposita, lineari basi  
planilatis utraque denticulo acuto brevissimo. superiora  
pubulato tridentata. denticuli laterales erecti in medio  
folii. Flores axillares sespiter in specis lateralibus unguin  
laribus imbricatis conferti. bractea pubulata tridentata  
parva imbricata. Calycis apice et lateribus utraque spinula  
flavescente subnervis terminati

pauciflora P. Hymis & capso tetragono, capitulo ovato

Hymis pauciflora; foliis linear-subulatis & lappum vaginantibus, capitulo oblongo, squamis ovatis obtusis Willden. phytog. 1. p. 2. t. 1. f. 1.

Habitat in India Orientali König, Rottler. 7

Folia angustiorima, bi vel tripollicaria, duo vel tria inferne in  
& lappo. Scapus filiformis, & pithamos vel panem ultra

Descript. reliqua adda ex Rottleri & Hedule

~~volis Heteranthus~~

~~Habitat in America septentrionali herb. Arch.~~

habes

filiiformis 9 Hynis Scapo filiiformi ancipiti, capitulo & quamvisque oblongis.  
Hynis filiiformis; culmo filiiformi compresso, capitulo ovato minimo  
mo Lamarckii. illustr. 1. p. 133.

Habitat ad Serram Leonam. Ex herbario Lamarckii  
Folia vix semipollicaria, angustissima, linearia. Scapi spithamei.  
Capitula magnitudine Geminis Borghi.  
Gene



fruticosa 4. caule ramoso, foliis imbricatis recto Thunb. In n. 1. tab. 1.

forma fruticosa: caule fruticoso ramoso Lin. Suppl. pag. 93. 4

Habitat in Cap. b. p. 5 e casu foliorum <sup>dentato</sup> & quamvis

caulis glaber rami inferne compressi <sup>dentati</sup> basi foliorum vix  
nante persistente, palmani folia <sup>attenuata supra & falcata</sup> lineana disticha polliciana  
vel ultra fuscum minor confusa, atter tenuissime striata. flower  
terminali <sup>pro</sup> foliari vel pluri pedunculati capillares basi  
spatha membranacea <sup>impugnata</sup> <sup>concolor</sup> corolla tubus capillaris semipollicaris  
flavus. limbus corollae

floribus terminalibus subsolitariis glabris

Subulata 10 Hyris & scapo filiformi, foliis subulatis, capitulo oblongo & tri-  
floro +

Hyris subulata; spica bi-triflora, scapo uniflora, foliis subulatis  
Dl. par. 1. p. 46. t. 71. f. 6.

Habitat in altis pennis locis humidis & tagnatisque.

Si Descriptio hujus et icon hujus fl. per. vera, discrepat a reli-  
quis Authens absque appendiculis eorumque loco & setis tribus apice  
& fundo corollae apice penicillatis, & stigmata indiviso. Eodem Plan  
Planta cespitosa. folia subpollicaria basi villosa. Scapus gracilis, fere  
bipalmaris. Capitulum bi-triflorum. Corolla lutea Dl. par. l. c.

Habitus. folia radicalia, glaberrima, basi vaginantis, Scapi  
erecti, simplicissimi ensiformia, scapo breviora, glaberrima, striata.  
Scapi erecti, simplicissimi, glabri. Capitulum terminale, solitari-  
um, untricatum squamis ferrugineis, margine splendentibus

Triangular Eriocaulon culmo triangulari, foliis ensiformibus, capitulo ovato  
Plantaginella aurea alopecuroides brasiliensis, foliis gramineis Breyn. cent.  
1807. 50. Monf. bot. 3. p. 259. f. 16. fig. 17.  
Habitat in Brasilia

non vidi