

Ziziphora. Cor. ringens: labio superiora reflecto, integro. Pal. filifer
mis. Sem. 4. nuda.

53
54. Ziziphora. Pal. tubulosus, ~~5~~ 5. dentatus. Cor. ringens: labio
superiora reflecto integro.

Ziziphora

1. capitata & fasciatis ternis, foliis ovatis
2. hispanica & floribus racemosis spicatis, bracteis foliisque ovatis nervosis acutis
3. tenuior & floribus verticillatis, foliis lanceolatis
4. acinoides & floribus verticillatis, foliis ovatis.

Scirpium serpyllacea suffruticosa, racemis terminalibus capitatis, foliis ovato
lanceolatis subseriatis, floralibus consimilibus Mart. in Schrad. j. f. 2. b. 1. 6.
pag. 455.

Habitat ad rivulorum margines et in collibus apricis pyrenæis inter Viubam
et veterem Schanachiam ♀

Thymus Marshallianus Wied.

capitata) Ziziphora fasciculis terminalibus, ^{bracteis ovatis} foliis caulibus ellipticis - lanceolatis, floribus
breviter ovatis

Clinopodium fistulosum humile India occidentalis, summo caule florifera
Dun Plukh. alm. 164. t. III. t. 164. f. 4.

Thymus humilis latifolius Boiss. cart. 3. p. 20. t. 51. f. 1.

Ziziphora capitata, fasciculis terminalibus, foliis ovatis Lin. Syst. Veg.
60.

Habitat in Syria, Armenia &c

Caulis palmaris et ultra, erectus, ramosus, pubescens. Folia petiolata,
integerrima, glaberrima. Pedunculi terminalis, ciliatis ^{vel nudi} breviter
cincti foliis quatuor, ovatis, attenuatis, ciliatis, nervosis. Calyces
pilosi, striati; laciniis aequales *

~~Thymus humilis latifolius~~ Colobanthus polytrichus

polytrichus L.

~~polyrhiza C~~

~~Calceolana polyrhiza. foliis ovatis in petiolum alatum attenuatis: floribus umbellatis. Baran. ii: v. p. 25. Tab. 441.~~

~~Habitat in America meridionalis proteris vulgo Despeado locis humidis et rupibus Falklandi~~

~~Radix obliqua Caulis vix pollicaris Solia simplex. Solia infera approximata, oblonga in petiolum attenuata, remota obscura dentata. Pedunculorum 3-4 pollicaris, apice foliis duobus brevibus, sessilibus. Pedicelli 5que inaequales, plerumque uniflori. Calycis lacinus ovato, trifido, ^{sub} villosa. Corolla lutea, rubro punctata: lobus superior breviter, concavum, cordatum; inferior fere pollicaris, caliciforme inflatum, ^{sub} gibbulae hians, apice ascendens. Capsula conica, bispica, bivalvis, biloculari. Baran.~~

hispanica 2 Diciphora floribus racemoso spicati, bracteis obovatis nervosis acutis, foliis ovatis Lin. Am. ac. 2. 4. p. 263.

Habitat in Hispania O

Caulis palmari, erectus, brachiatus, durus: Rami erecti, uti caulis villosus cinerei. Folia petiolata, hemijunguicularia, acuta, pilosissima integerrima, pilosiuscula, nervosa, subtilis punctata. Spicae flores ~~ex~~ medio caulis, frequenter, utrinque terni, breviter pedunculati, approximati. Bracteis ^{obtusis foliis, parva majoribus} rhombis subrotundo, ~~de~~ ^{acuminato, sessilibus} punctato. Calyx bracteo parum longior, strictus, pilosus. ~~Aliam habeo foliis lanceolatis, bracteis ovatis acutis spicis brevioribus, bracteis ovatis attenuatis, forte modo cultura pauci varietas.~~

Scabra C. foliis oblongis venis linearibus dentatis, caule aspero fl. penur. 1. pag. 19 tab. 29
fig. a.

Habitat in Termis et omnino prostratis.

Caule ^{neuro} prostrato, hispido scabro, tripedales, virgati, Vires, purpureo ferruginei, super dichotome divisi. Lami fenati, breves. Folia approximata, subsessile patentia, rugosa, ^{hispida} margine revoluta. Pedunculi ex axillis superioribus et apice foliorum juncti flori, Longitudo foliorum. fl. P. L. C.

Spicata 3 Ziziphora floribus racemose spicati imbricatis, bracteis ovatis acutis nervosis, foliis lanceolatis subsessilibus

Ziziphora spicata; spicis densis terminalibus foliis oblongis, foliis imbricatis. Ann. hist. nat. Mex. 4. n. 12. p. 254.

Habitat in Hispania C.

Caulis octo decem ad octiduum pollicari, basi ramo uno altero altitudine caulis. Folia nervosa, inferiora petiolata, superiora sessilibus. Flores plures, praeter pedicellati, approximati. Bracteis lato, integerrimo acuto, ciliato. Ann. h. n. l. c.

An mera varietas? Hispania differe videtur foliis lanceolatis floralibus angustioribus; floralibus ovatis nec obovatis.

~~et spicis ovatis multo longioribus
caulis erecto, teres, vix 12 pollicari. Folia ovata, ciliata, nervosa, sessilibus, superiora ovata, inferiora petiolata, lanceolata, nervosa, integerrima, acuta, ciliata. Bracteis ovatis, integerrimis, acutis, ciliatis. Ann. h. n. l. c.~~

added in contextibus medicinalibus. Lich. Thuf. Salvia

acetabulosa^B Salvia foliis obovatis dentatis, calycibus paucifloris campanu-
latis pilosis, caule fruticulosulo. Lin. Mant. 25. Et long. Sal. no 6.

Salkey Hauss. 2. 11. c. 9. pag. 121. D. 2.

Salvia peregrina Haussw. Gesn. op. Schrad. 2. 1. p. 121. V. 12. p. 103.

Salvia orientalis frutescens, foliis cinnamatis, acetabulis moluillo Tour-
nef. Cor. 10.

Habitat in Oriente 5

Caulis fruticulosus, ramosus. Folia petiolata, subdentata, subtus to-
mentosa. Verticilli sexflori: flores pedicellati. Bractea ovata,
integerrima, acuminata, glabra, ciliata, calyce minoris. Calyx
amplus, patens, quinque-dentatus. Corolla albido-purpureascentis
calyce longior. Labii superioris bifido Eding. 6.

23

tenuior & Ziziphora tenuior floribus lateralibus, foliis lanceolatis Lin. Syst.
Veg. 68.

Habitat in Syria ☉

Caulis perithamius, erectus, basi ramosus, uti rami ^{hirsutus} pilosus. Folia radice
duo paria inferna ovata, obtusa, reliqua lanceolata, acut attenuata
triacuta, & emipollicaria, ^{integerrima} sub ciliata, obsolete quinque nervia, sub-
tus punctata. Flores inde a basi fer, tres vel quatuor utrinque, folio
duplo breviores. Calycis ¹⁵ striati 9 non punctis elevatis pili feris adpres-
si.

Trandru *C. foliis incispinnatifidis*, ramis ^{atropis} pedunculisque glandulosis ^{marginebusque calycis} ~~pelosis~~
floribus *Trandru*

Forcellana Trandra: foliis incispinnatifidis, floribus *Trandru* *Cavan.*

7. 5. pag 32. tab. 48.

Habitat in Peru &

caulis fruticosus, teres, tripedalis et ultra, rami oppositi cortice atro sanguineo: folia interstitia multo breviora: lacina dentibus utrinque 2-3 serratis, subtus glauca. Petioli folio breviores, basi membrana amplectente aucti. Pediculi dichotomi: pedicelli gemini uniflori in dichotomia uti margo calycis piloso glandulosis. Corolla leuca, cymbiformis, bilabiata labiis subaequalibus, concavis. filamenta 3. brevissima. Germen subtermen
foun *Cavan*

5
acinoidea & Ziziphora floribus lateralibus, foliis ovatis, calycibus cauleque hispidis.

Clinopodium supinum incarnum Comm. rith. n. 66.

Ziziphora acinodes, floribus lateralibus; foliis ovatis Lin. Spec. pl.

31.

Habitat in Sibiria ☉

Planta hispido-canescens. Folia ovata uniquilana, basi attenuata, acumine brevi terminata. Flores in quatuor vel duos inferiores remotiores, superiores confertiores, breviter pedunculata, foliis breviora. Stamina calycis striis punctis elevatis adspersa.

Paulis herbaceus:

Habitus Herb. Rami oppositi, simplices. Folia petiolata, nervosa, sub integerrima.
Ped. uniflori uniperi calycis striati, fauce villosi

3 tenuior *Diriphora floribus lateralibus, foliis lanceolatis* L. V. 68. 3. *Spec. pl. p.*

~~9313~~

Cleinos sylvatica, foliis mucronato, capsulis hirsutis Monf. h. 3. p. 404. f. 11

Tab. 19. f. 3. 4.

Habitat in Syria? ☉

Planta palmaris vel *Spithamea* ramosa erecta caule ramisque
pelosi: folia petiolata utraque attenuata unguiculata
ciliata, in decembris, glabra, obscure nervosa. pedicelli 3. 4.
utraque. folia floralia fructura foliorum caulis calycis
in medio longioribus. Calycis strati frui punctis elevatis
hirsuti hirti.