

*Diary*

7. Eryppus

Habitat in Persia herbarium de Lesfert.

Præter veretur, uti reliqua planta iniano Tomcatofa. Spino gemino, alter reflexus, alter rectus, apice glabris unguicularis. Folia subrotunda, trinervia, undecyma. Fructus magnitudine pipi, glaber

angulatus Liryphus

Habitat herb. la Martini

Rami purpurei, glaber nudi, quinqueangulati, nudi. Folia breviter petiolata, sesqui-  
pollicaria, ovato-oblonga, obtusissima, subtus minima, glabra, trinervi, axillaria.  
Spinae duo stipulares, patentes, semiinquinatae. Pedunculi terminalis, <sup>ed.</sup> biflori  
Flores umbellati, quatuor

ea eadem ac illa sub nomine Hygetner descripta in herb. Puf.

*rugosus* L'acqshus

Habitat herb. La Maritimi

Spina solitaria recurva. Folio bipollucana

volubili Zizyphus inermis, foliis oblongis repandis lineatis, caule scandente.

Habitat in Louisiana herb. Guss.

Rami teretes, glabri, cinerei vel fusco purpurascetes. Folia petiolata, sesqui pollicaria, vel minor, basi subrotunda, acuta, interdum obtusiuscula, remote crenata, supra nitida asperia, secundum nervos lineata, subtus nervis obliquis exstantibus, tenuissimis, obscure senop-reticulata inter nervos. Pedunculi axillares solitarii, petiolo breviores. Pedicelli umbellati, plures. Flores glabri: Calicinis ovato.

Confer cum Rhama volubili quae forte eadem Planch. Annot. 8. 360. fig. 2.

*nermis Zizyphus*

*Zizyphus nermis* La Mark

Habitat in India orientali herb. Guss.

Rami teretes, cortice cinereo, inferne glabri, superne villosuli. Folia petio  
lata, sesqui pollicaria, oblonga, obtusa trinervi, supra glabra, juniora  
puberula villosa, adulta tantum nervi et costa, subtilissimi venosa, semi  
lata. Aculei nulli. Pedunculi plures in ramulo brevissimis axillari,  
uniflori, inaequali, uti flores. Cocco aculeorum stipula lineari rigidius  
scula.

proidea

angulatus L. zypus

*Lizyphus angulatus* Lamour.

Habitat herb. Guss.

Rami flexuosi, pentagoni, angulis acutis, glabri. Folia subcordata, subrotunda,  
vel oblonga, pollicaria, serrata basin versus integerrima, obtusa, subtrinaeria  
trinervia, subtus venoso-reticulata, breviter petiolata, utrinque glabra. An-  
teri gemini recti, semipollicares, aequales.

Sinensis Zizyphus foliis ovatis oblongis basi subaequalibus acute serratis trinerviis  
obtusis

Habitat in China herb. Guss.

Rami flexuosi, teretes, purpurascens. Spina altera tenuis, altera recurva



mauritanus Zizyphus

Zizyphus mauritanus La Mart.

Habitat in insula Francia Herb. Desfont.

Rami inferne glabri, superne tomentosi, uti folia subtus. aculei solitarii par-  
vi, parvi, stipulari. Folia bipollicaria, ovalia, trinervia. Sauci omnino  
turgido.

my *Halimolobos* Rh. inermis floribus her magnitudinis, stigmatibus triplicibus, foliis cordatis,  
ramis circumferens Hort. kew. l. p. 266  
Habitat in Othequa 5

mauritanica Erythraea aculeis geminatis altero recurvo, foliis oblongis  
obtusis pubescentibus, fructu oblongo La Mart. Geni:  
Habitat in Insula Francia 5

non vidi

rotundifolius 2. aculeis geminatis altero recurvo folus subrotundo  
ovalibus subtus tomentosis La Mart. En.

*Fuzuba* f. *receptus* & *zeylanica*: rotundifolia venata minor  
folus subtus fere lanuginosis Planch. alm. 199. t. 197. fig.

2.  
Habitat in Zeylona 5

michi ignotus

angulata? aculeis geminis rectis, foliis subrotundo ovalibus  
subdentatis utraque glabris, ramis acute angulatis  
La Man. Enc.  
Hab. Ind.

non vid.

negosa L. azuleu subgeminatis recurvatis, foliis lato ovalibus rugosis  
serulatis corymbis tomentosis pedunculatis dichotomis La  
Mark. Enc.

Frutex hispanicus fruticosus corymbis densis spicis brevibus  
nervis crassis Pluk. n. tab. 29. fig. 7  
Habitat in Ind. orientali

non-vidi

an idem cum L. Hylongoo

*Pinopsis* ramulis annatis aculeatis pubescentibus, retusioni-  
bus in crumbeis, foliis ovato-oblongis acute serratis La  
Mare Eric:

Habitata China non vidi

penurana L. inermis, foliis ovato-rotundatis vixte dentatis  
subangulatis, petalis stellatis, calycis marginibus. La Moir.  
Habitat in Pen.

or Abanaru penuraru



agrosti Rhamnus aculeis geminis rectis, foliis oblongis, flombus racemosis

Louv. fl. Cochinch. pag. 150.

Habitat in Cochinchina.

Arbustula. aculei breves. folia ovato-oblonga integerrima alternata.  
Spike globosa minima. Nervis tuberculatis

non vidi

Loponfer Rhamnus aculei sparsi, foliis lanceolatis enerviis, floribus  
solitariis lous-fl. Portnach-pag, 50.

Habitat in China septentrionali. 5

Arbor parva Rami tortuosi. Aculei rami solitarii sparsi. folia  
inde gemma alterna et opposita. flores axillares rubri. Drupe  
parva sperma.

non vidi

Zizyphus B. aculeis geminatis: altero recurvo floribus digynis, foliis ovato-  
oblongis ten. - L. V

Zizyphus Dod. pempt 807

Zuzuba sylvestris Bauh. pin. 446

vs. Zuzuba majoris oblonga Bauh. pin. 446

Habitat in Europa australi &

Rami teretes glaberrimi a rama ad ramuleam flexuosi ramulis  
subrecti. cortex cinereus vel fuscus, laves. Folia brevissime petiolata  
peltata altero latere angustiori obtusa interdum emarginata  
interdum mucronata serrata, glaberrima trinervi subtus nervis  
aculei validi in ramis altero patenti ramuli subnervi. flores  
axillares aggregati pedunculati.

— pedunculi axillaribus aggregati

variat ramis albidis foliis subtandis unguiculatis her. h. thos

Lotus R. aculeis geminatis: altero recurvo foliis ovato oblongis Lin. Spec. pl.  
pag. 201.

Caryophyllus Sylvestris Tournes. inf. R. 4. 627. Shaw. afr. 631. fig. 631.

Habitat in Regno Tuncetano

Rami teretes glabri <sup>ut in romali aculeati</sup> a foliis ad folium flexuosi. Folia breviss-  
ime petiolata, unguiculata, utrinque <sup>caulisque equalibus</sup> glabra <sup>supra</sup> obtusa basi  
acutiora remote crenata. Aculei <sup>supra</sup> aciculares, alter rectus longior  
alter reflexus brevior pedunculi axillares aggregati pauci.

---

foliis oblongis glabris obtusis remote crenatis pedun-  
culis axillaribus aggregatis

Sinenfu 22.

Latham

Oenoplia R. aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis subsessilibus,  
foliis semiorbatis subtomentosis Lin. Cl. Zeyl. 824

Ayuba aculeata, nervosi foliis infra fereis flavis Burm. Zeyl. 131. t. 61.

Habitat in Zeylona t. f. t. i.

Rami teretes, flexuosi, ramuli alterni villosi, flexuosi. aculei  
gemini breves <sup>subter</sup> ~~alterni~~ <sup>altero subventro</sup> flexi. folia petiolata sesquipollicina, trines  
altero latere <sup>angustiora</sup> vix oblonga, subtus villosa subtomentosa subvenosa. Pedunculi  
axillares breves pedicelli subumbellati. Baccis magnitudine peperis regni  
globosa.

gemini altero reflexo umbellae axillaribus subsessilibus foliis  
oblongis subtus acutiusculis subtus subserratis

juguba R. aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis floribus pemi-  
digynis, foliis retusis subtus tomentosis. An fl. zeyl. 894

Penon Toddal Rheid Mal. 4. p. 41.

Malus indica Rumph. amb. 2. p. 117. t. 36

Habitat in India 7

Rami flexuosi tenetes tomentosi rari uti folia subtus petoli, <sup>oculic</sup> ~~spina~~

caulis  
subequali-  
bus

Et floes. Folia petiolata oblongo ovato-oblonga bipolliciana tunc  
tra <sup>supra</sup> secundum nervo lineat glabra nervi obliqui inter marginem  
et nervi laterali semulata, subtus saevosa simpliciter nervo veno  
fo aculei gemini (an semper) parvi <sup>to</sup> ~~patenti~~. Pedunculi axilla  
vix seminaqueulari, solitarii pedicelli umbellati pedunculo  
longiori plures.

recurvis, umbellis pedunculati

Such apple Barbados, ultra in antillis, mont. Pleasant N. Amer.

mauriana 2

La mark.



*subaculeatus*  
Hylopyrus foliis ovalibus serratis mucronatis subtus canaliculatis corymbis axilla-  
ribus incanis

Rhamnus Hylopyrus caule aculeato, aculeis recurvis, foliis ovatis  
subtus tomentosis, floribus corymbosis R. et. Ab. pag. 2. p. 11.

Habitat in India orientali

Rami incanis reticulati aculeus fere solitarius recurvus. Folia  
petiolata trinervia basi margine nervis obliquis bipolliciana  
altero latere breviora subtus nervosa venosa incana juniora  
supra subulata. Corymbis axillaribus. Flores hermaphroditi pentandri

Monopyrus

similis jugula folia non retusa



vidua folia 2

La mark

angulata

napeia Rhamnus aculeis subgeminatis recurvis; pedunculis corymbosis, floribus semidi-  
gynis, foliis serratis utrinque lobatis L. Flor. Zeyl. 87. \* S. V. p. 234

Tyuba indica spenosa, folio et fructu longiore Plur. alm. 199. 8216. fig. 6. Raii  
Vendr. 44.

Vid. ara Littorea Rumph. Amb. 2. p. 119. t. 42.

Habitat in Zeylona. 7

Arbor. Rami subullosi. Folia alterna, ovata, versus basin altero serrata postico latere  
angustiora, obtusiuscula, glabra, trinervia, venis fere subserrata, petiolata, subtus  
glabra, flavescens. Corymbi florum solitarii, foliis brevioris, laterales, juxta petiolum.  
aculeis e regione pedunculi, brevissimis, niger, recurvus; acutissimus, saepe duplici  
acumine, altero infra alterum L. Fl. Zeyl. l. c.

nervi in meo subtus ferrugineo tomentoso

peninsula

heterogeneus *N. aculeis geminis recurvis, foliis ovatis serrulatis tri-*  
*nervis luteis, pedunculis solitariis unifloris Burm. in*  
*Habitat in Ind. Orient.*

non vidi

Caperpi *R. aculeis foliatis*, foliis ovatis ext. ciliis integris glabris, umbellis  
axillaribus. Thurb. prod. p. 44  
Habitat in Cap. b. p. 5

novi



subcaulis h. aculeis foliatis reflexis, foliis oblongis glabris, corymbis axillaribus dichotomis

Habitat in Ceylone in Dalt  
Rami teretes superne fulvo tomentosi. Folia petiolata bipinnata  
nā et ultra 3nervia venosa supra secundum nervos lacini-  
bus sine parvo subcordata subtus pallidiora costis subullosis  
aculei breves validi basi tomentosi. Petala petioli semurquidula  
versullosi pedunculi fulvo tomentosi uti flores; dichotome ramosi.

*Cicumdisus* R. aculeis solitariis recurvis oppositifoliis, foliis oppositis basi  
obcordatis Lin. Suppl. p. 152. + P.V. p. 235

Habitat in India orientalis Sumatra &

Rami simpliciter oppositi recurvati, solidi. Folia petiolata coram  
obsoleta denticulata. Stipulae duo minutissimo. Inflorescentia  
racemosa laterales aboque aculeis umbellata petiolo longioribus  
plicis. Cal: campanulatus unicus per limbo erecto 5 partito

Petalis obcordatis ciliatis nuda antheras in involucria. Panicula  
globosum basi vestitum calycis unicus per basi

Semina tria obcordata, compressa Lin

Raphis lucida herb. mei secund. herb. la Martini Rami patentes per superum  
+ stragone

~~novi~~ an hujus generis

nummulana R: aculeis solitariis geminisque recurvis, foliis ovatis  
integerrimis, pedunculis corymbosis

Plankton - aln. 1. 197.

Habitat

non vidi